

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ГЛУТАРГИН АЛКОКЛИН

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Глутаргин алкоклин

Международное непатентованное или группировочное наименование: аргинина глутамат

Лекарственная форма: порошок для приготовления раствора для приема внутрь

Состав:

Один пакет содержит:

Действующее вещество: Аргинина глутамат (в пересчете на 100 % вещество) - 1,00 г.

Вспомогательные вещества: глицин - 0,50 г, маннитол (Е 421) - 0,79 г, лимонная кислота (безводная) - 0,60 г, аспартам (Е 951) - 0,06 г, ароматизатор лимонный - 0,05 г

Описание: порошок от белого до белого с желтоватым оттенком цвета с фруктовым запахом.

Фармакотерапевтическая группа: гепатопротекторное средство.

Код АТХ: А05ВА01

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Аргинина глутамат является соединением аргинина и глутаминовой кислоты, которые играют важную роль в обеспечении биохимических процессов нейтрализации и выведения из организма высокотоксичного метаболита обмена азотистых веществ - аммиака. Оказывает гепатопротекторное действие, обладая антиоксидантной, антигипоксической и мембраностабилизирующей активностью, позитивно влияет на процессы энергообеспечения в гепатоцитах.

При алкогольной интоксикации аргинина глутамат стимулирует утилизацию алкоголя в монооксигеназной системе печени, предупреждает угнетение ключевого фермента утилизации этанола - алкогольдегидрогеназы; ускоряет инактивацию и выведение токсических продуктов метаболизма этанола в результате увеличения образования и окисления янтарной кислоты; снижает угнетающее влияние алкоголя на центральную нервную систему (ЦНС) за счет нейромедиаторных свойств возбуждающей глутаминовой

кислоты.

Аргинина глутамат не оказывает эмбриотоксических, гонадотоксических и мутагенных эффектов, не вызывает аллергических и иммунотоксических реакций.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания к применению

- Профилактика алкогольного опьянения.
- Профилактика гепатотоксического действия алкоголя.
- Лечение алкогольной интоксикации легкой и средней степени тяжести.
- Лечение постинтоксикационных расстройств после алкогольного отравления тяжелой степени в составе комплексной терапии.

Противопоказания

- гиперчувствительность к компонентам препарата;
- детский возраст до 18 лет;
- период беременности и кормления грудью;
- фенилкетонурия

С осторожностью

- лихорадочное состояние;
- повышенная возбудимость;
- тяжелые нарушения фильтрационной (азотовыделительной) функции почек (клиренс креатинина менее 30 мл/мин).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата Глутаргин алкоклин противопоказано во время беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Препарат назначают взрослым внутрь независимо от приема пищи, предварительно растворив пакет в 1/4–1/2 стакана воды.

Для профилактики опьянения и гепатотоксического действия алкоголя назначают 2 пакета (2 г аргинина глутамата) за 1-2 ч до приема алкоголя или 1 пакет (1 г аргинина глутамата) за 1 ч до приема алкоголя и 1 пакет (1 г аргинина глутамата) в течение 0,5 ч после приема

алкоголя.

Для лечения алкогольной интоксикации легкой и средней тяжести назначают по 1 пакету (1 г аргинина глутамата) 4 раза в день с интервалами 1-2,5 ч, в последующие 2-3 дня - по 1 пакету (1 г аргинина глутамата) 2 раза в сутки.

При алкогольном отравлении тяжелой степени назначают по 1 пакету (1 г аргинина глутамата) 2 раза в сутки в течение 20 дней в составе комплексной терапии.

Побочное действие

Редко могут наблюдаться чувство легкого дискомфорта в эпигастральной области и тошнота непосредственно после применения препарата, которые проходят самостоятельно.

Передозировка

Симптомы

Тошнота, рвота, боль в области грудной клетки, чувство дискомфорта в эпигастральной области, бессонница, преходящее кратковременное снижение артериального давления, атриовентрикулярная блокада, аллергические реакции.

Лечение

Лечение симптоматическое, при необходимости прием антигистаминных средств, в тяжелых случаях - внутривенное введение глюкокортикостероидов.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Следует соблюдать осторожность при сочетании препарата Глутаргин алкоклин со следующими лекарственными средствами:

- Аминофиллин повышает концентрацию эндогенного инсулина в крови под влиянием препарата Глутаргин алкоклин.
- Препарат Глутаргин алкоклин может усиливать эффект антиагрегантных средств (дипиридамол и др.), предупреждает и ослабляет нейротоксические явления, которые могут возникать при терапии изониазидом, ослабляет эффект винбластина.

Особые указания

При назначении пациентам с нарушениями функций эндокринных желез следует учитывать, что препарат может незначительно увеличивать секрецию инсулина и гормона роста, что не требует коррекции медикаментозной терапии у пациентов с сахарным диабетом и/или акромегалией.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность управления транспортными средствами и работать с механизмами.

Форма выпуска

По 3 г порошка (1 г аргинина глутамата) в пакет (№ 1) или в спаренные пакеты (№ 2) из комбинированного материала для фармацевтических препаратов.

По два, пять или десять пакетов (№ 1) или по пять спаренных пакетов (№ 2) вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

ООО «АТРАПАК»

Россия, 115280, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская Слобода, д.26, этаж -3, помещ./ком. IV/145

Производитель

ООО «ЭСКО-ФАРМ»,

город Ереван 0079, община Нор Норк, 5-й массив, ул. Микояна 13, Республика Армения

Организация, принимающая претензии потребителей

Российская Федерация

Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-юридический центр» (ООО «ЭЮЦ»)

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.03.2026 № 5410
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0000)

Россия, 109174, г. Москва, ул. Таганская, д.3, БЦ Таганский пассаж, эт.6 (Офис ООО
«ЭЮЦ»)

Телефон: +7 (495) 477-55-60

Электронная почта: pvchief@bloft.ru