МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-004839/10- 170521
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Ораблок

(торговое наименование лекарственного препарата)

раствор для инъекций, 40 мг/мл + 5 мкг/мл, 40 мг/мл + 10 мкг/мл

(лекарственная форма, дозировка)

Перрель С.п.А., Италия

(наименование производителя, страна)

Изменение № 5

Дата внесения Изменения «____» 170521 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: Состав на 1 мл раствора для инъекций 40 мг/мл + 5 мкг/мл содержит: *Активное вещество:* артикаина гидрохлорид 40 мг; эпинефрина гидротартрат (адреналина тартрат) в пересчете на эпинефрин (адреналин) 5 мкг. *Вспомогательные вещества:* натрия хлорид 1 мг, натрия дисульфит (натрия метабисульфит) 0,5 мг, вода для инъекций до 1 мл. Состав на 1 мл раствора для инъекций 40 мг/мл + 10 мкг/мл содержит: *Активное вещество:* артикаина гидрохлорид 40 мг; эпинефрина гидротартрат (адреналина тартрат) в пересчете на эпинефрин (адреналин) 10 мкг. *Вспомогательные вещества:* натрия хлорид 1 мг, натрия дисульфит (натрия метабисульфит) 0,5 мг, вода для инъекций до 1 мл.	**Состав:** Состав на 1 мл раствора для инъекций 40 мг/мл + 5 мкг/мл содержит: *Действующее вещество:* артикаина гидрохлорид 40 мг; эпинефрина гидротартрат (адреналина тартрат) в пересчете на эпинефрин (адреналин) 5 мкг. *Вспомогательные вещества:* натрия хлорид 1 мг, натрия дисульфит (натрия метабисульфит) 0,5 мг, вода для инъекций до 1 мл. Состав на 1 мл раствора для инъекций 40 мг/мл + 10 мкг/мл содержит: *Действующее вещество:* артикаина гидрохлорид 40 мг; эпинефрина гидротартрат (адреналина тартрат) в пересчете на эпинефрин (адреналин) 10 мкг. *Вспомогательные вещества:* натрия хлорид 1 мг, натрия дисульфит (натрия метабисульфит) 0,5 мг, вода для инъекций до 1 мл.

Описание: бесцветная прозрачная жидкость **Условия хранения** Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Не замораживать! Хранить в недоступном для детей месте.	**Описание:** бесцветный прозрачный раствор. **Условия хранения** При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Генеральный директор
ООО «ФармРегС» К.И. Рубцова