МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Транквезипам

наименование лекарственного препарата

таблетки 0,5 мг и 1 мг

лекарственная форма, дозировка

ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», Российская Федерация

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Срок введения изменений с «__» 24.11.11 2011 г.

Старая редакция	Новая редакция
Торговое название препарата: Транквезипам	**Торговое наименование препарата:** Транквезипам®
Взаимодействие с другими лекарственными средствами Транквезипам совместим с другими препаратами, вызывающими угнетение функции центральной нервной системы (снотворные, противосудорожные, нейролептические и др.), однако при комплексном применении необходимо учитывать взаимное усиление их действия. Снижает эффективность леводопы у больных паркинсонизмом. Ингибиторы микросомальных ферментов печени повышают риск развития токсических эффектов и уменьшают эффективность. Увеличивает концентрацию имипрамина в сыворотке крови. Гипотензивные средства могут усиливать выраженность снижения артериального давления.	**Взаимодействие с другими лекарственными средствами** Транквезипам® совместим с другими препаратами, вызывающими угнетение функции центральной нервной системы (снотворные, противосудорожные, нейролептические и др.), однако при комплексном применении необходимо учитывать взаимное усиление их действия. Снижает эффективность леводопы у больных паркинсонизмом. Ингибиторы микросомальных ферментов печени повышают риск развития токсических эффектов и уменьшают эффективность. Увеличивает концентрацию имипрамина в сыворотке крови. Гипотензивные средства могут усиливать выраженность снижения артериального давления.

Старая редакция	Новая редакция
На фоне одновременного применения клозапина возможно усиление угнетения дыхания.	На фоне одновременного применения клозапина возможно усиление угнетения дыхания.
Особые указания	**Особые указания**
При почечной/печеночной недостаточности и длительном лечении необходим контроль за картиной периферической крови и «печеночными» ферментами.	При почечной/печеночной недостаточности и длительном лечении необходим контроль за картиной периферической крови и «печеночными» ферментами.
Частота и характер побочного действия зависят от индивидуальной чувствительности, дозы и продолжительности лечения. При уменьшении доз или прекращении приема Транквезипама побочные эффекты исчезают.	Частота и характер побочного действия зависят от индивидуальной чувствительности, дозы и продолжительности лечения. При уменьшении доз или прекращении приема Транквезипама® побочные эффекты исчезают.
Подобно другим бензодиазепинам, обладает способностью вызывать лекарственную зависимость при длительном приеме в больших дозах (более 4 мг/сут).	Подобно другим бензодиазепинам, обладает способностью вызывать лекарственную зависимость при длительном приеме в больших дозах (более 4 мг/сут).
Использование непосредственно перед родами или во время родов может вызывать у новорожденного угнетение дыхания, снижение мышечного тонуса, снижение артериального давления, гипотермию и слабый акт сосания (синдром «вялого ребенка»).	Использование непосредственно перед родами или во время родов может вызывать у новорожденного угнетение дыхания, снижение мышечного тонуса, снижение артериального давления, гипотермию и слабый акт сосания (синдром «вялого ребенка»).
Препарат усиливает действие алкоголя, поэтому употребление спиртных напитков в период лечения Транквезипамом противопоказано.	Препарат усиливает действие алкоголя, поэтому употребление спиртных напитков в период лечения Транквезипамом® противопоказано.
Препарат противопоказан во время работы водителям транспорта и другим лицам, выполняющим работу, требующую быстроты психомоторных реакций и точных движений.	Препарат противопоказан во время работы водителям транспорта и другим лицам, выполняющим работу, требующую быстроты психомоторных реакций и точных движений.

Старая редакция	Новая редакция
Предприятие изготовитель/ организация, принимающая претензии ОАО «Дальхимфарм», 680001, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, 22, т/ф (4212) 53-91-86.	**Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата / организация, принимающая претензии** ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», 680001, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, 22, т/ф (4212) 53-91-86.

Генеральный директор
ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» Ю.П. Швец

«___» _____2011 г.