ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ВИКАЛИН

Регистрационный номер

Торговое название: Викалин
Лекарственная форма: таблетки
Состав
Каждая таблетка содержит в качестве активных веществ:

Висмута нитрата основного	-0,35 г
Магния карбоната основного	-0,4 г
Натрия гидрокарбоната	-0,2 г
Коры крушины в порошке	-0,025 г
Корневища аира в порошке	-0,025 г
Келлина	-0,005 г
Рутина	-0,005 г

Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, тальк, стеариновая кислота.
Описание
Таблетки светло-коричневого цвета с заметными вкраплениями, в изломе светло-коричневого цвета, однородные или с вкраплениями темного цвета, плоскоцилиндрические с фаской и риской
Фармакотерапевтическая группа: антисептическое кишечное и вяжущее средство
Код АТХ: A02BX
Фармакологические свойства
Комбинированный препарат, оказывает вяжущее, антацидное, спазмолитическое и мягкое слабительное действие. Магния карбонат и натрия гидрокарбонат снижают кислотность желудочного сока, уменьшают активность пепсина. Висмута нитрат образует защитную пленку на слизистой желудка, оказывая противовоспалительное, бактерицидное, репаративное действие. Входящие в состав аир и келлин оказывают спазмолитическое действие, крушина- слабительное.
Показания к применению
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гиперацидный гастрит.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, гипоацидный гастрит, почечная недостаточность, беременность, лактация.
Способ применения и дозы
Внутрь по 1-2 таблетки 3 раза в день после еды с ¼ стакана теплой воды (таблетки следует измельчить или растворить в указанном количестве воды).
Курс лечения – 1-2 месяца. Повторный курс – после консультации с врачом.

ЗАО «ПФК ОБНОВЛЕНИЕ»
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РЕГИСТРАЦИИ
КУСТОВА Е.В.

Побочное действие
Аллергические реакции, учащение стула.
Особые указания
Кал во время приема препарата приобретает темно-зеленую или черную окраску.
Необходимо учитывать возможность развития энцефалопатии, связанной с накоплением висмута в ЦНС при длительном применении препарата в высоких дозах.
Форма выпуска
По 10 таблеток в контурную безъячейковую упаковку. По 10, 20, 30 таблеток в контурную ячейковую упаковку. По 1, 2, 3, 5, 10 контурных безъячейковых или контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. По 300 контурных упаковок с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку.
Условия хранения
В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.
Срок годности
5 лет. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Без рецепта.

Производитель
ЗАО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»
Новосибирская обл., р.п. Сузун, ул. К. Зятькова 18
630071 г. Новосибирск, ул. Станционная, 80. тел./факс (3832) 59-11-99.

Директор ИДКЭЛС, профессор В.В.Чельцов

Генеральный директор
ЗАО «ПФК Обновление» В. Б. Калустов

ЗАО «ПФК ОБНОВЛЕНИЕ»
НАЧ. ОТДЕЛА РЕГИСТРАЦИИ
КУСТОВА Е.В.