ЛП-№(007317)-(РГ-RU) от 21.10.2024

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 16.10.2024 № 22660
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЖЕЛУДОЧНЫЙ СБОР №3

Регистрационный номер

Торговое наименование.

Желудочный сбор №3.

Международное непатентованное или группировочное наименование.

Аира обыкновенного корневища + Валерианы лекарственной корневища с корнями + Крапивы двудомной листья + Крушины ольховидной кора + Мяты перечной листья.

Лекарственная форма.

Сбор - порошок.

Состав.

Крапивы двудомной листья	30 %
Крушины ольховидной кора	30 %
Мяты перечной листья	20 %
Аира обыкновенного корневища	10 %
Валерианы лекарственной корневища с корнями	10 %

Описание.

Смесь неоднородных частиц растительного сырья темно-зеленого цвета с многочисленными желтовато-коричневыми, желтовато-оранжевыми, а также серовато-зелеными, зелеными, желтовато-белыми и темно-коричневыми включениями. Запах ароматный. Вкус водного извлечения горьковато-пряный, слегка холодящий.

Фармакотерапевтическая группа.

Растительного происхождения средство.

Фармакологическое действие.

Настой сбора оказывает противовоспалительное, спазмолитическое, желчегонное и «мягкое» слабительное действие.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 16.10.2024 № 22660
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Показания к применению.

В качестве симптоматического средства при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся болями спастического характера; запор (в качестве «мягкого» слабительного средства).

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; калькулезный холецистит, кишечная непроходимость, спастические запоры, кровотечения из желудочно-кишечного тракта, синдром «острого» живота, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы.

1 фильтр-пакет (2 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают и настаивают 30 мин, периодически надавливая на пакетик ложкой, затем его отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Принимают внутрь по 1/2 стакана теплого настоя утром и вечером. Длительность курса лечения зависит от характера заболевания и определяется лечащим врачом. Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции. При длительном применении возможны чувство жажды, головная боль, боли в области сердца, снижение массы тела, ослабление или отсутствие слабительного эффекта, запор.

Если у вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 16.10.2024 № 22660
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Передозировка.

Возможны коликообразные боли в животе. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами.

Не описано.

Особые указания.

Если при применении препарата симптомы сохраняются без улучшения более 2 недель или ухудшаются, следует обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч., управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Сбор – порошок. По 2,0 г в фильтр-пакет из бумаги термосвариваемой; по 20 фильтр-пакетов укладывают в пачки картонные. Пачки упаковывают в пленку полипропиленовую. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°с.

Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности.

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель/Держатель регистрационного удостоверения.

ООО Фирма «Здоровье». Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.

Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430,

Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А,

телефон +7 (495) 566-00-14, E-mail: sales@lektrava.ru