ЛП-№(014377)-(РГ-RU) от 09.04.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 06.04.2026 № 7018
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ВИКАИР

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Викаир

Международное непатентованное или группировочное наименование: Аира обыкновенного корневища+Висмута субнитрат+Крушины ольховидной кора+Магния карбонат+Натрия гидрокарбонат

Лекарственная форма: таблетки

Состав

Одна таблетка содержит:

Действующие вещества:

висмута субнитрат (висмута нитрат основной)	– 350 мг
магния карбонат (магния карбонат основной)	– 400 мг
натрия гидрокарбонат	– 200 мг
крушины ольховидной кора	– 25 мг
аира обыкновенного корневища	– 25 мг

Вспомогательные вещества: крахмал картофельный – 115,5 мг, кальция стеарат – 11,5 мг, тальк – 23 мг.

Описание: круглые плоскоцилиндрические таблетки светло-коричневого, розовато-коричневого или розовато-лилового цвета с белыми и темными вкраплениями с фаской и риской.

Фармакотерапевтическая группа: средства для лечения кислотозависимых заболеваний; противоязвенные средства и средства для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ); другие противоязвенные средства и средства для лечения ГЭРБ.

Код АТХ: A02BX

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат, оказывает вяжущее, антацидное, слабительное и спазмолитическое действие.

Магния карбонат и натрия гидрокарбонат снижают кислотность желудочного сока, уменьшают активность пепсина.

Висмута субнитрат образует защитную пленку на слизистой оболочке желудка, оказывая противовоспалительное, бактерицидное, репаративное действие.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 06.04.2026 № 7018
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Входящие в состав корневища аира, обладающие спазмолитическим действием, и кора крушины, обладающая слабительным действием, способствуют улучшению пассажа по кишечнику.

Показания к применению

Викаир показан к применению у взрослых старше 18 лет при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническом гастрите с повышенной секрецией (со склонностью к запору).

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, хронический гастрит с секреторной недостаточностью, хроническая почечная недостаточность, энтероколит, детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены), беременность, период грудного вскармливания.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы

Внутрь, через 1–1,5 часа после еды с 1/4 стакана теплой воды (таблетку следует измельчить или растворить в указанном количестве воды), по 1–2 таблетки 3 раза в день.

Средняя продолжительность курса лечения 1–2 месяца. При необходимости возможно проведение повторного курса лечения после консультации с врачом.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Нежелательные реакции сгруппированы по системно-органным классам в соответствии со словарем MedDRA:

Нарушения со стороны иммунной системы: аллергические реакции (кожный зуд, кожная сыпь, крапивница).

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: послабление стула.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки препаратом не зарегистрировано.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 06.04.2026 № 7018
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

На фоне приема м-холиноблокаторов или блокаторов H_2-гистаминовых рецепторов уменьшается потребность в применении препарата. Снижает всасывание тетрациклинов. В сочетании с другими лекарственными средствами, содержащими висмут, повышается концентрация висмута в крови.

Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Викаир проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Нецелесообразно назначать пациентам с язвенной болезнью в сочетании с хроническим аппендицитом, холециститом и пациентам со склонностью к кровотечениям. Необходимо учитывать возможность развития энцефалопатии, связанной с накоплением висмута в центральной нервной системе. В период лечения кал окрашивается в черный цвет.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Викаир не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Форма выпуска

Таблетки.

По 10 таблеток в контурную безъячейковую упаковку из бумаги с полиэтиленовым покрытием или из заготовок на основе бумаги для контурных безъячейковых упаковок лекарственных средств.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 2 или 3 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

50, 100, 200, 300 или 700 контурных безъячейковых упаковок или контурных ячейковых упаковок вместе с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в ящик из гофрированного картона (для стационаров).

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 06.04.2026 № 7018
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителей

АО «ДАЛЬХИМФАРМ», 680001, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, д. 22, т/ф (4212) 53-91-86, info@dhph.ru.

Наименование производителя и адрес места производства лекарственного препарата

АО «ДАЛЬХИМФАРМ», 680001, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, д. 22, стр. 4, 8, т/ф (4212) 53-91-86, info@dhph.ru.