МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
СОРБЕКС

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать применение этого препарата, так как она содержит важную для Вас информацию.

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП001133-050617
СОГЛАСОВАНО

- Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться вновь.
- Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.
- Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.

Регистрационный номер: ЛП-001133

Торговое наименование: Сорбекс

Международное непатентованное или группировочное наименование: активированный уголь

Лекарственная форма: капсулы

Состав на 1 капсулу:

действующее вещество: уголь активированный 250,0 мг.

Состав капсулы:

корпус капсулы: краситель железа оксид черный (Е 172) 1,33 %, краситель бриллиантовый черный (Е 151) 0,71 %, желатин до 100 %;

крышечка капсулы: краситель железа оксид черный (Е 172) 1,33 %, краситель бриллиантовый черный (Е 151) 0,71 %, желатин до 100 %.

чернила для нанесения маркировки на капсулу: шеллак (Е 904), титана диоксид (Е 171).

Описание: Капсулы твердые желатиновые № 0, корпус капсулы черного цвета, крышечка черного цвета с нанесенной маркировкой «SORBEX» белого цвета. Содержимое капсулы: сыпучий крупный блестящий порошок черного цвета.

Фармакотерапевтическая группа: энтеросорбирующее средство

Код АТХ: A07BA01

Фармакологические свойства

Фармакодинамика. Дезинтоксикационное, адсорбирующее средство. Характеризуется большой поверхностной активностью, обуславливающей способность связывать вещества, понижающие поверхностную энергию (не изменяя их химическую природу). Сорбирует газы, токсины, алкалоиды, гликозиды, соли тяжелых металлов, салицилаты, барбитураты и другие соединения, уменьшает их всасывание в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) и способствует

выведению из организма с фекалиями. Слабо адсорбирует кислоты и щелочи (в том числе соли железа, цианиды, малатион, метанол, этиленгликоль). Не раздражает слизистые оболочки.

Фармакокинетика. В ЖКТ не всасывается, не расщепляется. Выделяется полностью через желудочно-кишечный тракт в течение 24 часов.

Показания к применению

- Применяется в качестве детоксицирующего средства при экзогенных и эндогенных интоксикациях различного происхождения.
- При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся диспепсией, метеоризмом.
- При комплексном лечении пищевой токсикоинфекции, сальмонеллеза, дизентерии.
- При отравлении лекарственными препаратами (в т.ч. психотропными, снотворными, наркотическими средствами), алкалоидами, солями тяжелых металлов и другими ядами (в составе комплексной терапии).
- При пищевой и лекарственной аллергии.
- При гипербилирубинемии (вирусный гепатит и другие желтухи).
- При гиперазотемии (почечная недостаточность).
- Для уменьшения газообразования в кишечнике перед ультразвуковым и рентгенологическим исследованием.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата;
- язвенные поражения желудочно-кишечного тракта (в т. ч. язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, неспецифический язвенный колит) в стадии обострения, кровотечения из желудочно-кишечного тракта;
- атония кишечника;
- детский возраст до 7 лет (для данной лекарственной формы);
- одновременное применение антитоксических лекарственных средств, эффект которых развивается после всасывания (метионин и др.).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Возможно применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Внутрь, в капсулах за 1-2 ч до или после еды и приема других лекарственных средств. Режим дозирования: взрослым в среднем 2-8 капсул (0,5-2 г) 3-4 раза в сутки, максимальная разовая

доза - до 12 капсул (3 г).

Детям старше 7 лет применять по 1-3 капсуле 3-4 раза в день.

Курс лечения при острых заболеваниях - 3-5 дней, при аллергии и хронических заболеваниях - до 14 дней. Повторный курс через 2 недели по рекомендации врача.

При остром отравлении лечение начинают с промывания желудка с использованием взвеси активированного угля, затем дают внутрь до 80-120 капсул препарата (до 20-30 г активированного угля) в сутки, по 10-12 капсул через небольшие интервалы времени.

При метеоризме принимают внутрь по 4-8 капсул (1-2 г препарата) 3-4 раза в сутки. Курс лечения 3-7 дней.

Побочное действие

Диспепсия, запор или диарея. При длительном применении (более 14 дней) - гиповитаминоз, снижение всасывания из желудочно-кишечного тракта питательных веществ (жиров, белков), гормонов, кальция. Окрашивание кала в темный цвет.

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препарата не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препарат снижает всасывание и эффективность лекарственных препаратов, применяемых внутрь одновременно с ним.

Особые указания

При лечении интоксикации необходимо создать избыток угля активированного в желудке (до его промывания) и в кишечнике (после промывания желудка). Уменьшение концентрации угля активированного в среде способствует десорбции связанного вещества в просвет кишечника и его всасыванию в кровь; для предупреждения резорбции рекомендуется повторное промывание желудка с углем активированным и назначение угля активированного внутрь. Если отравление вызвано веществами, участвующими в энтерогепатической циркуляции (сердечные гликозиды, индометацин, морфин и др. опиаты), необходимо применять препарат в течение нескольких дней.

Рекомендуется хранить в сухом месте, отдельно от веществ, выделяющих в атмосферу газы или пары. Хранение на воздухе (особенно влажном) снижает сорбционную способность. При наличии гиповитаминоза, который может сопровождаться длительным применением угля активированного, необходимо назначить поливитамины.

Длительный прием препарата (более 10-14 дней) может привести к дефициту витаминов, гормонов, жиров, белков, и других вещество в организме, что потребует соответствующей

лекарственной и/или алиментарной коррекции.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Капсулы 250 мг.

По 10 капсул или по 2 капсулы в блистере из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой с односторонним покрытием термолаком и печатью с другой стороны.

По 2 блистера по 10 капсул вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в картонную пачку.

100 блистеров по 2 капсулы вместе с 10 инструкциями по медицинскому применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С, отдельно от веществ и материалов, которые выделяют пары и газы.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска

Без рецепта

Производитель

ООО «ВАЛАРТИН ФАРМА»

08130, Украина, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Чайки, ул. Грушевского, 60.

Организация, принимающая претензии от потребителей:

ОАО «Бофарм»

РФ, 123182, г. Москва, а/я 4.

Тел.: +7 (495) 942-5327

Заместитель директора
ООО «ВАЛАРТИН ФАРМА» Перемот З.П.