

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

АЛЛОХОЛ-УБФ

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Аллохол –УБФ

Международное непатентованное или группировочное наименование: активированный уголь+желчь+крапивы двудомной листья+чеснока посевного луковицы

Лекарственная форма: таблетки, покрытые оболочкой

Состав

Одна таблетка, покрытая оболочкой, содержит

Действующие вещества: активированный уголь - 0,025 г
желчь (желчь крупного рогатого скота сухая) - 0,080 г
крапивы двудомной листья - 0,005 г
чеснока посевного луковицы (чеснок сушеный порошок) - 0,040 г

Вспомогательные вещества:

Ядро: магния оксид (магния оксид тяжелый), крахмал картофельный, тальк, кремния диоксид коллоидный (аэросил), кальция стеарат

Оболочка: сахароза (сахар), магния карбонат (магния карбонат основной, легкий), тальк, кремния диоксид коллоидный (аэросил), титана диоксид, повидон К17, метилцеллюлоза водорастворимая, мука пшеничная, крахмал картофельный, тропеолин О, воск пчелиный.

Описание

Таблетки круглые, двояковыпуклые, покрытые оболочкой, желтого цвета. Допускается слабый специфический запах желчи. На поперечном разрезе видны три слоя.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей. Средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей. Другие средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей.

Код АТХ: А05АХ

Фармакологические свойства**Фармакодинамика**

Комбинированный препарат. Желчегонное (холекинетическое и холеретическое) средство, снижает процессы гниения и брожения в кишечнике. Усиливает секреторную функцию клеток печени, рефлекторно повышает секреторную и двигательную активность органов желудочно-кишечного тракта. Усиливает образование желчи и желчных кислот. Действие желчи обусловлено рефлекторным влиянием на секреторную функцию паренхимы печени. Желчь усиливает также секреторную и двигательную функции желудочно-кишечного тракта. Вещества, содержащиеся в чесноке, усиливают секреторную и моторную функцию желудочно-кишечного тракта, стимулируют секрецию желчи. Листья крапивы обладают желчегонным и противовоспалительным свойствами. Уголь активированный является адсорбентом, связывающим токсические вещества в желудочно-кишечном тракте.

Фармакокинетика

Действующие вещества препарата хорошо всасываются в желудочно-кишечном тракте. Холевая и хенодезоксихолевая кислоты, содержащиеся в препарате, подвергаются 7-альфа-дегидроксилированию в кишечнике. Хенодезоксихолевая кислота, кроме того, подвергается метаболизму в печени: конъюгирует с аминокислотами, секретируется в желчь, откуда вновь выделяется в кишечник, затем частично реабсорбируется; остальная часть выводится через кишечник.

Показания к применению

В составе комплексной терапии: хронический реактивный гепатит, холангит, бескаменный (некалькулезный) холецистит, гипокинетическая (гипомоторная) дискинезия желчевыводящих путей, атонические запоры, постхолецистэктомический синдром.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующим веществам или к любому из вспомогательных веществ, обтурационная желтуха, калькулезный холецистит, острый гепатит, острая и подострая дистрофия печени, острый панкреатит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, острый энтероколит, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; детский возраст до 12 лет.

С осторожностью

У пациентов с сахарным диабетом и у лиц, находящихся на диете с пониженным содержанием углеводов.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

При беременности и в период грудного вскармливания применение препарата возможно по рекомендации врача и только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы

Принимают внутрь после еды.

Детям старше 12 лет — по 1 таблетке 3 раза в день в течение 3-4 недель.

Перед применением препарата у детей следует проконсультироваться с врачом.

Взрослые - по 1-2 таблетки 3-4 раза в день. Курс лечения 3-4 недели.

При обострении заболеваний применяют по 1 таблетке 2-3 раза в день в течение 1-2 месяцев.

Повторные курсы лечения проводят с интервалом в 3 месяца после консультации врача.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Представленные ниже возможные нежелательные реакции распределены по системноорганному классам с указанием частоты их возникновения: очень часто ($>1/10$); часто ($>1/100$, но $<1/10$); нечасто ($>1/1000$, но $<1/100$); редко ($>1/10000$, но $<1/1000$); очень

редко ($<1/10000$), частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).

Нарушения со стороны иммунной системы: частота неизвестна - аллергические реакции.

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: частота неизвестна - диарея.

Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей: частота неизвестна - повышение активности «печеночных» трансаминаз в сыворотке крови.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: диарея, тошнота, изжога, кожный зуд, повышение активности «печеночных» трансаминаз в крови.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препараты, содержащие алюминия гидроксид, колестирамин, колестипол снижают абсорбцию и уменьшают эффект препарата. Одновременный прием нецелесообразен.

Одновременное применение препарата с холеретиками синтетического или растительного происхождения усиливает желчеобразование.

Комбинация препарата со слабительными лекарственными средствами приводит к устранению запоров.

Препарат способствует лучшему всасыванию жирорастворимых витаминов. Применение препарата с антисептиками или химиотерапевтическими средствами при инфекционных процессах в печени или желчных путях улучшает терапевтическую эффективность последних.

Особые указания

В состав препарата входит сахароза, что следует учитывать пациентам, с сахарным диабетом. В одной таблетке содержится около 0,09 г сахарозы (сахара), что соответствует 0,009 ХЕ; в максимальной суточной дозе препарата содержится около 0,72 г сахарозы (сахара), что соответствует 0,072 ХЕ.

Если лечащий врач сообщил, что у Вас непереносимость некоторых сахаров, перед приемом данного лекарственного препарата обратитесь к лечащему врачу.

Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Таблетки, покрытые оболочкой.

По 10, 24 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной с термосвариваемым покрытием.

По 20, 50, 70 таблеток в банки полимерные с навинчиваемыми крышками. На банку наклеивают этикетку самоклеящуюся.

Каждую банку или 1, 2, 5 контурных ячейковых упаковок по 24 таблетки или 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

АО «Уралбиофарм» 620026, Россия, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, стр. 60.

тел. (343) 254-01-93

Производитель

АО «Уралбиофарм», 620026, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,

ул. Куйбышева, стр. 60

тел. (343) 254-01-93

Организация, принимающая претензии потребителя

АО «Уралбиофарм», 620026, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,

ул. Куйбышева, стр. 60

тел. (343) 254-02-45