ИНСТРУКЦИЯ

(информация для потребителей)
по медицинскому применению препарата
ЙОКС®
(JOX®)

Регистрационный номер:
Торговое название препарата: ЙОКС®
Международное непатентованное название или группировочное название:
Повидон-йод + Аллантоин&
Лекарственная форма: раствор для местного применения

Состав:
Активные вещества:
Повидон-йод 4,250 г и аллантоин 0,050 г в 50 мл раствора.
Повидон-йод 8,500 г и аллантоин 0,100 г в 100 мл раствора.
Вспомогательные вещества:
левоментол, кислота лимонная моногидрат, натрия цитрат дигидрат, этанол 96 %, пропиленгликоль, вода очищенная – до необходимого объема препарата в упаковке.

Описание
Прозрачная или слабо опалесцирующая жидкость красно-коричневого цвета, неограниченно смешиваемая с водой.
Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство
Код АТХ: A01AD; R02AA15

Фармакологические свойства
Комбинированный препарат для местного применения при заболеваниях полости рта и ЛОР-органов. При контакте с кожей или слизистыми оболочками выделяет йод; оказывает антисептическое и противовоспалительное действие.
Препарат обладает широким спектром противомикробного действия.
Активен в отношении бактерий, грибов, вирусов, простейших.

Показания к применению
1. Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки: в том числе ангины, тонзиллиты, тонзилофарингиты, глосситы, стоматиты, афты;
2. Для обработки полости рта и глотки при хирургических вмешательствах на дыхательных путях и полости рта и в послеоперационном периоде;
3. Для лечения инфекций полости рта и горла, возникающих при химиотерапии;
4. При стрептококковых ангинах применяется как дополнительное средство при лечении антибиотиками.

Противопоказания.
- повышенная чувствительность к йоду и другим компонентам препарата;
- беременность и период кормления грудью;
- дети до 6 лет;
- нарушение функции щитовидной железы (гипертиреоз);
- сердечная недостаточность;
- герпетиформный дерматит Дюринга;
- одновременное применение радиоактивного йода.

Способ применения и дозы
Местно.
Раствор препарата разбавить водой в соотношении 1:20 – 1:40 (т.е. от 2,5 мл до 5 мл с помощью вложенного в упаковку мерного колпачка или ½ - 1 чайную ложку в 100 мл воды).
Разведенным раствором полоскать полость рта или глотки.
Использовать препарат Йокс® раствор рекомендуется 2 – 4 раза в день, в случае необходимости препарат можно применять и более часто до 6-ти раз в сутки. Минимальные интервалы между полосканиями 4 часа.

Побочное действие
Препарат Йокс® раствор обычно переносится хорошо.
В отдельных случаях возможны реакции повышенной чувствительности к препарату и проявление аллергической реакции на йод (зуд, гиперемия), что требует отмены препарата.
Длительное применение препарата может вызвать явление йодизма (в том числе металлический вкус, повышенное слюнотечение, отеки глаз или гортани), при появлении которого следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не рекомендуется одновременное применение препарата Йокс® с другими антисептическими средствами, предназначенными для местного применения в полости рта и глотки, особенно содержащие перекись водорода, в связи с инактивацией препарата.

Особые указания
Не предназначен для приема внутрь.
Не следует вдыхать или проглатывать препарат.
Препарат содержит около 19 % этанола.

Форма выпуска
Раствор для местного применения.
По 50 и 100 мл во флаконы темного стекла с навинчивающейся пропиленовой крышкой с контролем первого вскрытия и мерным колпачком. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещен в картонную пачку.

Условия хранения
При температуре от 10 °С до 25 °С в защищенном от света месте.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
5 лет.
Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке!

Условия отпуска
Без рецепта.

Производитель
Айвэкс Фармасьютикалс с.р.о., Чешская Республика
Острависка 29, 74770 Опава-Комаров
IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Ostravská 29, 74770 Opava-Komárov, Czech Republic

Адрес для приема претензий.
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, стр. 2, Бизнес-центр «Конкорд»
тел./факс: +7(495)644-22-34/35/36

И.о. директора ИДКЭЛС А.Н. Васильев

Представитель фирмы О.А. Иванова