

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
АЛОЭ ЭКСТРАКТ ЖИДКИЙ**Регистрационный номер:****Торговое наименование:** Алоэ экстракт жидкий**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Алоэ
древовидного листьев экстракт**Лекарственная форма:** раствор для подкожного введения**Состав****1 мл препарата содержит:***Действующее вещество*

Алоэ древовидного листьев экстракт — 4,0 мг
(Алоэ экстракт сухой*)
с содержанием суммы антрацен-
производных в пересчете
на алоэ-эмодин и сухое вещество
не менее 0,5 %

Вспомогательные вещества

Натрия хлорид — 8,5 мг
Вода для инъекций — достаточное количество
до получения 1 мл препарата

*Фармацевтическую субстанцию алоэ экстракт сухой получают из лекарственного растительного сырья: собранных в течение года в 2-4-летнем возрасте и биостимулированных свежих листьев вечнозеленого суккулентного культивируемого растения алоэ древовидного — *Aloe arborescens* Mill., семейство асфodelовые — *Asphodelaceae*.

Описание

Жидкость от светло-желтого до коричневатого-красного цвета с характерным запахом. Допускается наличие опалесценции или осадка, который при встряхивании образует опалесценцию.

Фармакотерапевтическая группа

Растительного происхождения средство.

Код АТХ: ~

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Биогенный стимулятор. Оказывает адаптогенное, общетонизирующее, противовоспалительное действие. Улучшает клеточный метаболизм, трофику и регенерацию тканей, повышает общую неспецифическую резистентность организма и устойчивость тканей, слизистых оболочек и кожи к действию повреждающих агентов, ускоряет процессы регенерации. Обладает некоторой противомикробной активностью в отношении стрептококков, стафилококков, брюшнотифозной и дизентерийной палочек, иммуностимулирующими свойствами.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению

В качестве биогенного стимулятора в комплексной терапии хронических заболеваний: в гастроэнтерологии (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки), дыхательных путей (хронический бронхит, пневмония), в гинекологии (аднексит, эндометрит), трофические язвы.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав препарата, тяжелые формы нарушения функции печени и почек, тяжелые формы сердечно-сосудистых нарушений, хроническая сердечная недостаточность, артериальная гипертензия, острые воспалительные заболевания органов желудочно-кишечного тракта, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Подкожно. Ежедневно по 1 мл (максимальная суточная доза – 3-4 мл).

Курс лечения 20-30 инъекций.

По рекомендации врача возможно проведение повторного курса через 2-3 месяца.

Побочное действие

Нежелательные реакции распределены в соответствии с классификацией поражения органов и систем органов согласно словарю MedDRA.

Нарушения со стороны иммунной системы: аллергические реакции.

Нарушения со стороны обмена веществ и питания: гипертермия.

Нарушения со стороны сосудов: повышение артериального давления.

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: диарея.

Передозировка

При передозировке возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

При длительном применении препарата возможно уменьшение содержания калия в организме, что может способствовать усилению действия сердечных гликозидов и антиаритмических препаратов.

При одновременном применении препарата и тиазидных диуретиков, «петлевых» диуретиков, препаратов солодки, кортикостероидов повышается риск развития дефицита калия.

Особые указания

При болезненности инъекций вводят предварительно 0,5 мл 2 % раствора новокаина.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Раствор для подкожного введения.

По 1 мл в ампулы из нейтрального стекла с насечкой и точкой излома или с кольцом излома.

По 5 ампул помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной.

Две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 12 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают по рецепту.

Производитель

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, д. 14.

Держатель регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90.