

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
АЛОЭ СОК

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Алоэ сок

Международное непатентованное или группировочное наименование: Алоэ
древовидного листа

Лекарственная форма: сок

Состав

Для приготовления 1000 мл сока необходимо:

Алоэ древовидного листьев свежих

– достаточное количество
до получения 800 мл сока
неконсервированного

Спирта этилового 95 % (этанол)

– достаточное количество
до получения 1000 мл сока

Описание

Слегка мутная жидкость от оранжево-желтого до оранжевого цвета,пряного запаха.
Под влиянием света и воздуха темнеет. При хранении допускается появление осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Растительного происхождения средство.

Код АТХ: ~

Фармакологическое действие

Препарат содержит вещества, относящиеся к биогенным стимуляторам, введение в организм которых оказывает стимулирующее влияние на процессы обмена: улучшает клеточный метаболизм, трофику и регенерацию тканей; оказывает слабительное действие, обусловленное благоприятным влиянием на эвакуаторную функцию толстого кишечника, обладает желчегонными свойствами.

Показания к применению

Хронический гастрит, гастроэнтерит, энтероколит (комплексная терапия); хронические атонические и спастические запоры.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к соку алоэ древовидного листьев свежих, тяжелые формы сердечно-сосудистых заболеваний, артериальная гипертензия, острые воспалительные заболевания органов желудочно-кишечного тракта, тяжелые формы нарушения функции печени и почек, метроррагия, геморрой, цистит, кровохарканье, холелетиаз, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст (до 18 лет).

С осторожностью

Алкоголизм, заболевания печени, эпилепсия, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга (в связи с содержанием этилового спирта в препарате).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Внутрь, назначают по 1 чайной ложке (5 мл) сока за 20-30 мин до еды 2-3 раза в день. Курс лечения 15-30 дней.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, повышение артериального давления, гипогликемический эффект, гипертермия, диарея.

Если любые из указанных в инструкции нежелательных реакций усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При передозировке возможно усиление побочных эффектов.

Лечение: симптоматическое

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

При сохранении симптомов заболевания или ухудшения состояния на фоне применения препарата в течение 15 дней следует сообщить об этом лечащему врачу.

Препарат содержит не менее 18 % этанола. Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата (5 мл) составляет 0,72 г, в максимальной суточной дозе (15 мл) – 2,16 г.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Сок.

По 50 или 100 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробками полиэтиленовыми и крышками пластмассовыми навинчиваемыми или крышками алюминиевыми.

По 100 мл в банки оранжевого стекла, укупоренные колпачками алюминиевыми с перфорацией.

1 флакон или 1 банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

**Держатель регистрационного удостоверения/производитель/организация,
принимающая претензии потребителей**

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

142279, Московская обл., Серпуховский район, рабочий пос. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-90, 716-15-81.