ЛП-№(012974)-(РГ-RU) от 24.12.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 22.12.2025 № 31812
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Мукалтинекс

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Мукалтинекс

Международное непатентованное или группировочное наименование: алтея корней экстракт

Лекарственная форма: сироп

Состав:

100 г содержат:

Активный компонент: алтея корней экстракт сухой (с содержанием суммы восстанавливающих моносахаридов в пересчете на глюкозу не менее 1,0 %) – 2,00 г.

Вспомогательные вещества: сахароза (сахар) – 63,30 г; натрия бензоат – 0,38 г; вода очищенная – 34,32 г.

Описание: жидкость от светло-желтого до желтовато-коричневого цвета со слабым характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях; отхаркивающие средства, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами; отхаркивающие средства.

Код АТХ: R05CA05

Фармакологические свойства

Обладает рефлекторным отхаркивающим, а также местным противовоспалительным действием, снижает вязкость бронхиального секрета.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению

Препарат применяют в комплексной терапии заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (трахеит, трахеобронхит, бронхит).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 22.12.2025 № 31812
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Противопоказания

- повышенная чувствительность к алтея корней экстракту или другим компонентам препарата;
- наследственная непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, дефицит сахаразы-изомальтозы.

С осторожностью

Пациентам с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов. Перед применением препарата следует проконсультироваться с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Внутрь.

Детям до 12 лет - по 1 чайной ложке сиропа, предварительно разведенной в 1/4 стакана теплой воды, 3-4 раза в день после еды.

Детям старше 12 лет и взрослым - по 1 столовой ложке сиропа, предварительно разведенной в 1/2 стакана теплой воды, 4-5 раз в день после еды.

Длительность лечения составляет 10-15 дней.

Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по согласованию с врачом.

Если после лечения улучшения не наступило, то следует обратиться к врачу. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 22.12.2025 № 31812
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота.

Лечение: отмена препарата, промывание желудка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Если Вы принимаете другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Мукалтинекс необходимо проконсультироваться с врачом.

Особые указания

Пациентам с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов необходимо учитывать, что в 1 чайной ложке сиропа (5 мл) содержится около 4,2 г сахарозы (0,35 ХЕ), в 1 столовой ложке сиропа (15 мл) содержится около 12,6 г сахарозы (1,05 ХЕ).

Если при применении препарата симптомы сохраняются без улучшения в течение 7 дней или ухудшаются, следует обратиться к врачу.

Вспомогательные вещества

Препарат Мукалтинекс содержит сахарозу. Пациентам с редко встречающейся наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или дефицитом сахаразы-изомальтозы не следует принимать данный лекарственный препарат.

Препарат Мукалтинекс содержит натрия бензоат, который может усиливать желтуху (пожелтение кожи и глаз) у новорожденных (в возрасте до 4 недель). Усиление билирубинемии после вытеснения билирубина из связи с альбумином может усиливать желтуху новорожденных, которая может перерасти в ядерную желтуху (отложения неконъюгированного билирубина в головном мозге).

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат Мукалтинекс не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Форма выпуска

Сироп.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 22.12.2025 № 31812
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

По 50 г, 100 г, 125 г, 200 г во флакон темного стекла, укупоренный пробкой из полиэтилена высокого давления с крышкой из полиэтилена высокого или низкого давления или полипропилена или крышкой из полиэтилена высокого или низкого давления или полипропилена с контролем первого вскрытия, допускается использование крышки без пробки.

На флакон наклеивают этикетку из бумаги или самоклеящуюся этикетку.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Допускается вложение полимерной мерной ложки, мерного стаканчика или мерного колпачка в каждую пачку.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

Производитель

Российская Федерация

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Кировская обл., г.о. город Киров, г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

Организация, принимающая претензии потребителей

Российская Федерация

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 22.12.2025 № 31812
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

Тел.: (8332) 22-01-26

E-mail: kachestvo-s@k-ff.ru