ЛП-№(009236)-(РГ-RU) от 13.03.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.03.2025 № 6537
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

МИКСТУРА ОТ КАШЛЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СУХАЯ

Регистрационный номер:

Торговое наименование: МИКСТУРА ОТ КАШЛЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СУХАЯ

Международное непатентованное или группировочное наименование: Алтея корней экстракт + Аммония хлорид + Натрия бензоат + Натрия гидрокарбонат + Солодки корней экстракт

Лекарственная форма: порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей]

Состав на один пакет:

Действующие вещества:

Алтея корней экстракт сухой	- 0,300 г,
Солодки корней экстракт сухой	- 0,075 г,
Натрия бензоат	- 0,150 г,
Натрия гидрокарбонат	- 0,150 г,
Аммония хлорид	- 0,0375 г

Вспомогательные вещества:

Аниса обыкновенного плодов масло, сахароза

Описание

Неоднородный порошок светлого желтовато-коричневатого или коричневато-серого цвета с белыми и более темными вкраплениями, с запахом анисового масла, гигроскопичный. Водный раствор (1:10) имеет желто-коричневый или коричневый цвет.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях; отхаркивающие средства, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами; отхаркивающие средства.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.03.2025 № 6537
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Код АТХ: R05CA10

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат.

Оказывает отхаркивающее, противокашлевое и противовоспалительное действие, способствует удалению слизи из дыхательных путей. Алтея корней экстракт сухой усиливает секрецию бронхиальных желез, солодки корней экстракт сухой оказывает противовоспалительное, отхаркивающее и спазмолитическое действие. Натрия гидрокарбонат сдвигает pH бронхиальной слизи в щелочную сторону, снижает вязкость мокроты; натрия бензоат и аммония хлорид оказывают отхаркивающее действие.

Показания к применению

В качестве отхаркивающего средства при заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (в том числе трахеит, бронхит, бронхопневмония).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, острый гломерулонефрит, острый пиелонефрит, беременность, период грудного вскармливания. Дефицит сахаразы/изольматазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

С осторожностью

Пациентам с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов и низким содержанием натрия.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

При беременности и в период грудного вскармливания применение препарата противопоказано.

Способ применения и дозы

Внутрь, в виде раствора 3-4 раза в день после еды. Для приготовления раствора содержимое 1 пакета (1,47 г) растворяют в 15 мл (1 столовая ложка) охлажденной кипяченой воды. Препарат назначают детям в зависимости от возраста:

Детям до 1 года - по 15-25 капель;

Детям 1-2 лет - по 40 капель;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.03.2025 № 6537
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Детям 3-4 лет - по 1/2 чайной ложки (2,5 мл) = 50 капель;

Детям 5-6 лет - по 3/4 чайной ложки (3,75 мл) = 75 капель;

Детям 7-8 лет - по 1 чайной ложке (5 мл);

Детям 9-12 лет - по 2 чайные ложки (10 мл);

Детям старше 12 лет - по 1 столовой ложке (15 мл).

Курс лечения 2-3 недели. Проведение повторных курсов лечения возможно после согласования с врачом.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, тошнота, рвота, диарея; может оказывать раздражающее действие на слизистую оболочку желудка. В этих случаях прием препарата следует прекратить. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, снижающими образование мокроты.

Особые указания

Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что в 1 капле раствора препарата содержится около 0,0025 г (0,0002 ХЕ) углеводов, в 1 мл раствора препарата - около 0,05 г (0,004 ХЕ) углеводов, в 1 чайной ложке раствора препарата - около 0,25 г (0,021 ХЕ), в 1 столовой ложке раствора препарата - около 0,75 г (0,0625 ХЕ).

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.03.2025 № 6537
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь.

По 1,47 г лекарственного препарата в термосвариваемые пакеты из материала упаковочного комбинированного (бумага/полиэтилен), материала комбинированного «Буфлен» (полиэтилен/фольга/полиэтилен/бумага) или ламинированной бумаги (бумага/полиэтилен).

По 1, 3, 6, 10, 20 или 40 пакетов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона коробочного для потребительской тары или из картона хром-эрзац для складных коробок или из картона хром-эрзац макулатурного.

Условия хранения

При температуре не выше 25 ºС.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности

2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей:

ОАО «Ивановская фармацевтическая фабрика»

Россия, 153007, г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, д. 19-а

Тел.: (4932)33-42-73, факс: (4932)33-42-72

E-mail: ivff@yandex.ru

Владелец регистрационного удостоверения:

ОАО «Ивановская фармацевтическая фабрика»

Россия, 153007, г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, д. 19-а

Тел.: (4932)33-42-73, факс: (4932)33-42-72

E-mail: ivff@yandex.ru