ЛП-№(011658)-(РГ-RU) от 12.09.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 10.09.2025 № 22678
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

МИКСТУРА ОТ КАШЛЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СУХАЯ

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Микстура от кашля для детей сухая

Международное непатентованное или группировочное наименование: ~

Лекарственная форма: порошок для приготовления раствора для приема внутрь

Состав

Состав на одну упаковку:

Действующие вещества

Алтея корней экстракт сухой (полуфабрикат) с содержанием суммы восстанавливающих моносахаридов в пересчете на глюкозу 4,0 %	–	0,300 г
Солодки экстракт сухой с содержанием глицирризиновой кислоты в пересчете на моноаммонийную соль глицирризиновой кислоты гидрата и абсолютно сухое вещество 17,0 %	–	0,075 г
Натрия гидрокарбонат	–	0,150 г

Вспомогательные вещества

Сахар (сахароза)	–	0,7500 г
Натрия бензоат	–	0,1500 г
Аммония хлорид	–	0,0375 г
Анисовое масло	–	0,0037 г

Описание

Неоднородная порошковая смесь от серовато-коричневого до коричневато-серого с розоватым оттенком цвета с более светлыми и более темными вкраплениями со слабым характерным запахом. При хранении допускается комкование. Водный раствор препарата (1 : 10) должен иметь коричневый цвет.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях; отхаркивающие средства, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами; отхаркивающие средства.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 10.09.2025 № 22678
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Код АТХ

R05CA10.

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат.

Оказывает отхаркивающее и противовоспалительное действие. Алтея корней экстракт сухой усиливает секрецию бронхиальных желез; солодки экстракт сухой оказывает противовоспалительное, отхаркивающее и спазмолитическое действие. Натрия гидрокарбонат сдвигает pH бронхиальной слизи в щелочную сторону, снижает вязкость мокроты; натрия бензоат и аммония хлорид оказывают отхаркивающее действие.

Фармакокинетика: данные отсутствуют.

Показания к применению

В качестве отхаркивающего средства при заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (в том числе трахеит, бронхит, бронхопневмония).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, острый гломерулонефрит, острый пиелонефрит. Врожденная непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, дефицит сахаразы/изомальтазы.

Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

С осторожностью

Пациентам с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов и низким содержанием натрия.

Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Не рекомендуется при беременности и в период грудного вскармливания в виду отсутствия специальных исследований.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 10.09.2025 № 22678
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Способ применения и дозы

Внутрь, в виде раствора 3-4 раза в день после еды. Для приготовления раствора содержимое пакета (1,47 г) растворяют в 1 столовой ложке (15 мл) охлажденной кипяченой воды. Срок хранения раствора в холодильнике не более 2 суток. Перед употреблением взбалтывают.

Препарат назначают детям в зависимости от возраста:

до 1 года – по 15-20 капель;

от 1 года до 2 лет – по 40 капель;

от 3 до 4 лет – по ½ чайной ложки (2,5 мл);

от 5 до 6 лет – по ⅔ чайной ложки (3,75 мл);

от 7 до 8 лет – по 1 чайной ложке (5 мл);

от 9 до 12 лет – по 2 чайных ложки (10 мл);

старше 12 лет – по 1 столовой ложке (15 мл).

Курс лечения – от 14 до 20 дней. Проведение повторных курсов лечения возможно после согласования с врачом.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, тошнота, рвота, диарея; может оказывать раздражающее действие на слизистую оболочку желудка. В этих случаях прием препарата следует прекратить.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, ***сообщите об этом врачу****.*

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки при применении препарата не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не рекомендуется применять одновременно с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, снижающими образование мокроты.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 10.09.2025 № 22678
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Особые указания

Препарат содержит сахарозу.

Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что в 1 капле раствора препарата содержится около 0,0025 г (0,0002 ХЕ) углеводов, в 1 мл раствора препарата – около 0,05 г (0,004 ХЕ) углеводов, в 1 чайной ложке раствора препарата – около 0,25 г (0,021 ХЕ) углеводов; в 1 столовой ложке раствора препарата – около 0,75 г (0,0625 ХЕ) углеводов.

Препарат содержит натрий.

Пациентам, находящимся на диете с ограничением поступления натрия, необходимо учитывать, что в разовой дозе (1 пакет) препарата содержится 0,065 г натрия, в максимальной суточной дозе (4 пакета) – 0,26 г натрия.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь.

По 1,47 г в пакеты термосвариваемые из бумаги упаковочной с полиэтиленовым покрытием или из бумаги ламинированной, или из материала комбинированного. 10 или 25 пакетов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Допускается пакеты вместе с равным количеством инструкций по применению помещать в коробку или в ящик из картона (для стационаров).

Условия хранения

В сухом месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

1 год 6 мес.

Не применять по истечении срока годности.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 10.09.2025 № 22678
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, д. 14.

Владелец регистрационного удостоверения/ Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Адрес: 142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90.