ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

Мукалтин

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Мукалтин

Лекарственная форма: таблетки

Состав на 1 таблетку:

активного вещества: алтея лекарственного корней экстракт (мукалтин) 50 мг, вспомогательных веществ: натрия гидрокарбоната, винной кислоты, кальция стеарата.

Описание:

Круглые, плоскоцилиндрические таблетки, от светло-серого до коричневато-серого цвета с вкраплениями, со специфическим запахом, с фаской и риской.

Код АТХ: R05CA

Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающее средство растительного происхождения.

Фармакологические свойства

Мукалтин представляет собой смесь полисахаридов из травы алтея лекарственного, обладает отхаркивающими свойствами. Благодаря рефлекторной стимуляции усиливает активность мерцательного эпителия и перистальтику дыхательных бронхиол в сочетании с усилением секреции бронхиальных желез.

Показания к применению

Острые и хронические заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с трудноотделяемой мокротой повышенной вязкости (трахеобронхит, обструктивный бронхит, бронхоэктазы, пневмония и др.) – в составе комплексной терапии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно по рекомендации врача.

Способ применения и дозы
Внутрь взрослым и детям от 12 лет по 1-2 таблетки 2-3 раза в день перед едой. Курс лечения в среднем 7-14 дней. Детям можно растворить таблетку в 1/3 стакана теплой воды.

Побочные действия
Аллергические реакции, редко - диспепсические явления.

Передозировка
До настоящего времени случаи передозировки при применении препарата не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Мукалтин можно назначать одновременно с другими препаратами, применяемыми при лечении бронхолегочных заболеваний.
Мукалтин не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Форма выпуска
Таблетки по 50 мг.
По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.
По 10 таблеток в контурную безъячейковую упаковку из бумаги с полимерным покрытием.
По 30 таблеток в банку полимерную или флакон полимерный.
Каждую банку, флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.
По 100 контурных ячейковых упаковок или по 100 контурных безъячейковых упаковок вместе с таким же количеством инструкций помещают в пакеты из пленки полиэтиленовой.

Условия хранения
В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25 ^{0}С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии
ОАО «АВВА РУС», Россия, 610044, г. Киров, ул. Луганская, д. 53 А
тел.(8332) 53-60-11, (495) 956-75-54

Представитель фирмы
ОАО «АВВА РУС» Пименова О.Е.