ЛП-№(008997)-(РГ-RU) от 24.02.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.02.2025 № 4033
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

## Микстура от кашля для детей сухая

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** Микстура от кашля для детей сухая

**Международное непатентованное или группировочное наименование:**

Алтея лекарственного корней экстракт + Аммония хлорид + Натрия бензоат + Натрия гидрокарбонат + Солодки корней экстракт

**Лекарственная форма:** Порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей].

**Состав на 1 пакет:**

Действующие вещества - алтея корней экстракт сухой - 0,3000 г, солодки экстракт сухой - 0,0750 г, натрия гидрокарбонат - 0,1500 г, натрия бензоат - 0,1500 г, аммония хлорид - 0,0375 г;

*Вспомогательные вещества* - сахароза - 0,7500 г, аниса обыкновенного плодов масло - 0,0037 г.

*Масса порошка в упаковке* - 1,4700 г.

**Описание**

Неоднородная порошковая смесь коричневато-серого цвета с белыми вкраплениями с запахом анисового масла. Возможно комкование. Водный раствор препарата (1:10) имеет коричневый цвет.

**Фармакотерапевтическая группа:** Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях; отхаркивающие средства, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами; отхаркивающие средства.

**Код АТХ**

R05CA10

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.02.2025 № 4033
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

**Фармакологическое действие**

Комбинированный препарат.

Оказывает отхаркивающее, противовоспалительное действие. Алтея корней экстракт сухой усиливает секрецию бронхиальных желез; солодки экстракт сухой оказывает противовоспалительное, отхаркивающее и спазмолитическое действие. Натрия гидрокарбонат сдвигает pH бронхиальной слизи в щелочную сторону, снижает вязкость мокроты; натрия бензоат и аммония хлорид оказывают отхаркивающее действие.

**Фармакокинетика**

Не применимо

**Показания к применению**

В качестве отхаркивающего средства при заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (в том числе трахеит, бронхит, бронхопневмония).

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, острый гломерулонефрит, острый пиелонефрит, беременность и период грудного вскармливания. Врожденная непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, дефицит сахаразы/изомальтазы.

**С осторожностью**

Пациентам с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов и низким содержанием натрия.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

При беременности и в период грудного вскармливания применение препарата противопоказано.

**Способ применения и дозы**

Внутрь, в виде раствора 3-4 раза в день после еды. Для приготовления раствора содержимое 1 пакета (1,47 г) растворяют в 15 мл (1 столовая ложка) охлажденной кипяченой воды.

Препарат назначают детям в зависимости от возраста:

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.02.2025 № 4033
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

детям до 1 года – по 15-25 капель;

детям 1-2 лет – по 40 капель;

детям 3-4 лет – по ½ чайной ложки (2,5 мл) = 50 капель;

детям 5-6 лет – по ¾ чайной ложки (3,75 мл) = 75 капель;

детям 7-8 лет – по 1 чайной ложке (5 мл);

детям 9-12 лет – по 2 чайные ложки (10 мл);

детям старше 12 лет – по 1 столовой ложке (15 мл).

Курс лечения – 2-3 недели. Проведение повторных курсов лечения возможно после согласования с врачом.

*Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.*

**Побочное действие**

Возможны аллергические реакции, тошнота, рвота, диарея; может оказывать раздражающее действие на слизистую оболочку желудка. В этих случаях прием препарата следует прекратить.

*Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.*

**Передозировка**

До настоящего времени при применении препарата случаев передозировки не зарегистрировано.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не рекомендуется применять одновременно с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, снижающими образование мокроты.

**Особые указания**

Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что в 1 капле раствора препарата содержится около 0,0025 г (0,0002 ХЕ) углеводов, в 1 мл раствора препарата – около 0,05 г (0,004 ХЕ) углеводов, в 1 чайной ложке

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.02.2025 № 4033
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

раствора препарата – около 0,25 г (0,021 ХЕ), в 1 столовой ложке раствора препарата – около 0,75 г (0,0625 ХЕ).

**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

**Форма выпуска**

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь.

По 1,47 г лекарственного препарата в термосвариваемые пакеты из материала комбинированного, состоящего из бумаги, полиэтилена, алюминиевой фольги, полиэтилена.

По 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 100, 200 пакетов вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

По 10, 20, 25, 50, 100, 200, 300, 600 пакетов вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в запаянный пакет из пленки полиэтиленовой. На полиэтиленовый пакет наклеивают этикетку.

По 10, 20, 25, 50, 100, 200, 300, 600 пакетов вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пакеты из бумаги оберточной. На пакет из бумаги оберточной наклеивают этикетку.

*Для стационаров.*

По 25, 50, 100, 200, 300, 600 пакетов вместе с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в запаянный пакет из пленки полиэтиленовой. На полиэтиленовый пакет наклеивают этикетку.

**Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

2 года. Не применять по истечении срока годности.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.02.2025 № 4033
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей:**

ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Мелиген», Россия

Юридический адрес/адрес для направления претензий от потребителей: 188676, Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 53-а,

тел/факс: (812) 336-16-82. Сайт: meligen.com

Адрес производства: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. б/н.

**Владелец регистрационного удостоверения:**

ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Мелиген», Россия

Юридический адрес: 188676, Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 53-а, тел/факс: (812) 336-16-82.