

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

АЛЮМИНИЯ ФОСФАТ

Регистрационный номер:

Торговое наименование: АЛЮМИНИЯ ФОСФАТ

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Алюминия фосфат

Лекарственная форма: гель для приема внутрь

Состав

Состав на 1 пакетик:

Действующее вещество:

Алюминия фосфат гель 20 %	- 10,40 г
(соответствует алюминия фосфату	- 2,08 г)

Вспомогательные вещества:

Кальция сульфата дигидрат	- 0,012 г
Пектин	- 0,087 г
Агар-агар 800	- 0,045 г
Ароматизатор апельсиновый	- 0,080 г
Калия сорбат	- 0,040 г
Сорбитола раствор 70 % (не кристаллизующийся)	- 4,480 г
Вода очищенная	- до 16,0 г

Описание: белый или почти белый гомогенный после перемешивания гель с запахом апельсина.

Фармакотерапевтическая группа: средства для лечения кислотозависимых заболеваний; антациды; соединения алюминия.

Код АТХ: A02AB03

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Оказывает кислотонейтрализующее, обволакивающее, адсорбирующее действие. Снижает протеолитическую активность пепсина. Не вызывает ощелачивание желудочного сока, сохраняя кислотность желудочного содержимого на физиологическом уровне. Не приводит к вторичной гиперсекреции соляной кислоты. Образует защитный слой на слизистой

оболочке желудочно-кишечного тракта. Способствует удалению токсинов, газов и микроорганизмов на всем протяжении пищеварительного тракта, нормализует пассаж содержимого по кишечнику.

Фармакокинетика

Абсорбция

При приеме внутрь обладает низкой абсорбцией.

Элиминация

Большая часть алюминия фосфата нерастворима, незначительная часть преципитируется в кишечнике в виде оксидов и нерастворимых карбонатов.

Показания к применению

Препарат показан к применению у взрослых и детей в возрасте от 0 до 18 лет:

- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- гастрит с нормальной или повышенной секреторной функцией;
- грыжа пищеводного отверстия диафрагмы;
- гастроэзофагеальный рефлюкс, рефлюкс-эзофагит, в том числе сопровождающийся изжогой, кислой отрыжкой;
- синдром неязвенной диспепсии;
- функциональная диарея;
- функциональные заболевания толстой кишки;
- желудочные и кишечные расстройства, вызванные интоксикацией, приемом лекарственных препаратов, раздражающих веществ (кислоты, щелочи), алкоголя.

Противопоказания

Выраженные нарушения функции почек, повышенная чувствительность к препарату, наследственная непереносимость фруктозы.

С осторожностью

Не следует длительно принимать препарат без назначения врача.

С осторожностью применяют при наличии заболеваний почек, цирроза печени, выраженной сердечной недостаточности. У пожилых пациентов и больных с нарушением функции почек при применении препарата в рекомендованных дозах возможно увеличение концентрации алюминия в сыворотке крови.

Антибиотики тетрациклиновой группы, препараты железа, сердечные гликозиды следует принимать не ранее чем через 2 ч после приема препарата.

Применение во время беременности и в период грудного вскармливания

Возможно применение препарата в терапевтических дозах во время беременности и в период грудного вскармливания по показаниям.

Способ применения и дозы

Для взрослых и детей старше 6 лет – прием внутрь по 1-2 пакетика 2-3 раза в сутки. Схема приема зависит от характера заболевания: *гастроэзофагеальный рефлюкс, диафрагмальная грыжа* – сразу после еды и на ночь; *язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки* – через 1-2 ч после еды и немедленно при возникновении болей; *гастрит, диспепсия* – до еды; *функциональные заболевания толстой кишки* – утром натощак и на ночь. Если в промежутке между приемами препарата АЛЮМИНИЯ ФОСФАТ боли возобновляются – прием препарата повторить.

Для детей младше 6 месяцев – 1/4 пакетика или 1 чайная ложка (4 г) после каждого из 6 кормлений; старше 6 месяцев – 1/2 пакетика или 2 чайные ложки после каждого из 4 кормлений.

Препарат можно принимать в чистом виде или перед приемом развести в половине стакана воды.

Способ применения

Тщательно разомните содержимое пакетика между пальцами для получения однородного геля. Держа пакетик вертикально, отрежьте или оторвите уголок в обозначенном пунктирной линией месте. Выдавите пальцами гель через отверстие в пакетике. Гель принимают в чистом виде или разводят перед приемом в половине стакана воды.

Побочное действие

Редко – запоры (в основном у больных пожилого возраста, лежащих больных).

Передозировка

Большие количества ионов алюминия подавляют перистальтику кишечника. Для лечения передозировки следует применять слабительные средства.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При применении АЛЮМИНИЯ ФОСФАТА одновременно с другими лекарственными препаратами следует проконсультироваться с врачом, поскольку АЛЮМИНИЯ ФОСФАТ снижает эффективность действия некоторых препаратов.

Особые указания

При запорах, изредка возникающих при приеме АЛЮМИНИЯ ФОСФАТА, рекомендуется увеличивать количество ежедневно потребляемой воды.

Препарат может применяться больными, страдающими сахарным диабетом.

Препарат может применять профилактически для уменьшения адсорбции радиоактивных элементов.

Применение препарата АЛЮМИНИЯ ФОСФАТ не отражается на результатах рентгенологического исследования.

Вспомогательные вещества

Препарат содержит сорбитол. Пациентам с редко встречающейся наследственной непереносимостью фруктозы не следует принимать этот препарат.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на управление автотранспортом и занятия потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Гель для приема внутрь.

По 16 г в термосвариваемые многослойные пакетики из комбинированного материала.

По 6, 10, 20 пакетиков вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в картонную пачку.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

ООО «ВЕСТ», Россия, 117218, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 25, офис 5 этаж.

Производитель

ООО «Технопарк-Центр», Россия, Московская обл., г. Талдом, рп. Вербилки, ул. Лермонтова, д. 22а, стр. 1.

АО «Самарамедпром», Россия, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, зд. 99Б.

Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Технопарк-Центр», Россия, 123557, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Климашкина, д. 22, помещ. II, ком. 4. Тел./факс: +7 495 994-94-79.

АО «Самарамедпром», Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, помещ. 16Н/38. Тел./факс: +7 846 373-81-07.