

## ИНСТРУКЦИЯ

## ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

## Амбазон

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** Амбазон

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** амбазон

**Лекарственная форма:** таблетки для рассасывания

**Состав**

Состав на 1 таблетку:

*Действующее вещество:* амбазона моногидрат 10 мг

*Вспомогательные вещества:* сахароза 729 мг, лактозы моногидрат 150 мг, какао-бобов порошок 50 мг, повидон К-30 50 мг, ванилин 1 мг, стеариновая кислота 10 мг.

**Описание**

Круглые, плоскоцилиндрические, скошенные к краю таблетки, коричневого цвета с неповрежденными краями. Допускается наличие светлых и темных вкраплений.

**Фармакотерапевтическая группа:** препараты для лечения заболеваний горла; антисептики.

**Код АТХ:** R02AA01.

**Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика**

Обладает бактериостатическим действием. Оказывает местное противомикробное действие. Активен в отношении ряда грамположительных микроорганизмов (*Streptococcus haemolyticus*, *Streptococcus viridans*, *Pneumococcus*). Не влияет на микрофлору кишечника.

**Фармакокинетика**

Оптимальная терапевтическая концентрация в слюне достигается на 3-4 день приема препарата при дозе 0,03-0,05 г/сут.

**Показания к применению**

Симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки: тонзиллит, гингивит, стоматит, фарингит.

**Противопоказания**

Гиперчувствительность к амбазону и другим компонентам препарата; непереносимость лактозы, фруктозы, дефицит сахаразы/изомальтазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, дефицит лактазы; детский возраст до 3 лет.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Беременным и кормящим женщинам следует проконсультироваться с врачом перед применением препарата.

При беременности и в период грудного вскармливания применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

### **Способ применения и дозы**

Местно. Таблетки следует рассасывать до полного растворения (через 15-30 минут после еды).

После применения таблеток следует воздержаться в течение 3 часов от питья и приема пищи.

Взрослым: по 4-5 таблеток (0,04-0,05 г) в сутки.

Детям от 7 до 18 лет по 4-5 таблеток (0,04-0,05 г) в сутки.

Детям от 3 до 7 лет по 3 таблетки (0,03 г) в сутки.

Курс лечения 3-4 дня.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

### **Побочное действие**

Для определения частоты возникновения побочных эффектов препарата применяют следующую классификацию: очень часто ( $\geq 1/10$ ); часто ( $\geq 1/100$  и  $< 1/10$ ); нечасто ( $\geq 1/1000$  и  $< 1/100$ ); редко ( $\geq 1/10000$  и  $< 1/1000$ ); очень редко ( $< 1/10000$ ); частота неизвестна (не может быть установлена на основании имеющихся данных).

*Со стороны иммунной системы:* частота неизвестна: аллергические реакции.

*Со стороны кожи и подкожных тканей:* частота неизвестна: кожная сыпь.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

### **Передозировка**

#### *Симптомы*

Случаи передозировки амбазона неизвестны. Возможная передозировка может привести к симптомам дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта.

#### *Лечение*

Антидота нет. При применении чрезмерной дозы рекомендуется промыть желудок.

При появлении симптомов передозировки следует прекратить прием препарата и немедленно обратиться к врачу.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Клинически значимых взаимодействий с другими препаратами не выявлено.

### **Особые указания**

Не следует использовать препарат при наличии повышенной индивидуальной чувствительности к любому компоненту, входящему в состав препарата.

Увеличение дозы не оказывает большего клинического эффекта.

При сохранении симптомов или при повышении температуры тела, или головной боли следует обратиться к врачу.

#### *Вспомогательные вещества*

Если лечащий врач сообщил, что у Вас непереносимость некоторых сахаров, перед приемом данного лекарственного препарата обратитесь к лечащему врачу.

#### **Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами**

Препарат не оказывает влияния на способность управлять автотранспортом и механизмами, а также на занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

#### **Форма выпуска**

Таблетки для рассасывания 10 мг.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной/поливинилиденхлоридной или из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 10 или 20 таблеток в банки из полиэтилена низкого давления, укупороенные крышкой натягиваемой или навинчиваемой из полипропилена с контролем первого вскрытия. Свободное место может заполняться ватой медицинской гигроскопической.

По 1 или 2 контурные ячейковые упаковки, или по 1 банке вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

#### **Условия хранения**

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

#### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

#### **Держатель регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии потребителей**

ООО «Б-ФАРМ», Россия

Юридический адрес: 143026, Московская область, г.о. Одинцовский, р.п. Новоивановское, ул.

Агрохимиков, стр. 2А, ком. 2.

*Почтовый адрес:* 121309, г. Москва, а/я 15

Тел.: +7 (499) 145-59-99

Тел. горячей линии: +7 (926) 601-20-45

е-mail: [inbox@b-pharm.ru](mailto:inbox@b-pharm.ru)

**Производитель**

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

*Юридический адрес:* 142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

*Адрес места производства лекарственного препарата:* Московская обл., г. Серпухов, п.

Оболенск, тер. Квартал А, д. 14.