

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Фарингопронт

Регистрационный номер:**Торговое наименование:** Фарингопронт**Международное непатентованное или группировочное наименование:** амбазон**Лекарственная форма:** таблетки для рассасывания, таблетки для рассасывания со вкусом корицы, таблетки для рассасывания со вкусом лимона.**Состав на одну таблетку:**

	Таблетки для рассасывания	Таблетки для рассасывания со вкусом корицы / Таблетки для рассасывания со вкусом лимона
<i>Действующее вещество:</i>		
Амбазона моногидрат	10,0 мг	10,0 мг
<i>Вспомогательные вещества:</i>		
Лактитол	400,0 мг	400,0 мг
Лактозы моногидрат	150,0 мг	150,0 мг
Какао-порошок	98,0 мг	98,0 мг
Повидон	50,0 мг	50,0 мг
Гипромеллоза	42,0 мг	42,0 мг
Стеариновая кислота	10,0 мг	10,0 мг
Ароматизатор*	-	2,0 мг
Сорбитол	До получения таблетки массой 1400,0 мг	До получения таблетки мас- сой 1400,0 мг

* — в зависимости от вкуса лекарственного препарата используется ароматизатор лимон или ароматизатор корица.

Описание

Круглые двояковыпуклые таблетки от светло-коричневого до коричневого или оранжево-коричневого цвета с фаской, с вкраплениями от почти белого до темно-коричневого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: препараты для лечения заболеваний горла; антисептики.

Код АТХ: R02AA01.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Амбазон обладает бактериостатическим действием. Оказывает местное противомикробное действие. Активен в отношении ряда грамположительных микроорганизмов (*Streptococcus haemolyticus*, *Streptococcus viridans*, *Pneumococcus*). Не влияет на микрофлору кишечника.

Фармакокинетика

Оптимальная терапевтическая концентрация в слюне достигается на 3–4 день приема препарата при дозе 0,03–0,05 г/сут.

Показания к применению

Симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки: тонзиллит, гингивит, стоматит, фарингит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к амбазону и другим компонентам препарата; непереносимость лактозы, дефицит сахаразы/изомальтазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, дефицит лактазы; непереносимость фруктозы; детский возраст до 3 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Беременным и кормящим женщинам следует проконсультироваться с врачом перед применением препарата.

При беременности и в период грудного вскармливания применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы

Местно. Таблетки следует рассасывать до полного растворения (через 15–30 минут после еды). После применения таблеток следует воздержаться в течение 3 часов от питья и приема пищи.

Взрослым: по 4–5 таблеток (0,04–0,05 г) в сутки.

Детям: от 3 до 7 лет по 3 таблетки (0,03 г) в сутки.

Курс лечения 3–4 дня.

Побочное действие

Аллергические реакции на компоненты препарата, кожная сыпь.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки амбазона неизвестны. Антидота нет. Возможная передозировка может привести к симптомам дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта.

При применении чрезмерной дозы рекомендуется промыть желудок.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Клинически значимых взаимодействий с другими препаратами не выявлено.

Особые указания

Не следует принимать препарат при наличии повышенной индивидуальной чувствительности к любому компоненту, входящему в состав препарата.

Препарат противопоказано применять пациентам с наследственной непереносимостью лактозы.

Увеличение дозы не оказывает большего клинического эффекта.

При сохранении симптомов или при увеличении температуры тела, или головной боли следует обратиться к врачу.

Сорбитол метаболизируется с образованием фруктозы, поэтому препарат противопоказан пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность управлять автотранспортом и механизмами, а также на занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания, 10 мг; таблетки для рассасывания со вкусом корицы, 10 мг; таблетки для рассасывания со вкусом лимона, 10 мг.

По 6 или 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной/поливинилиденхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 1, 2, 3, 4 или 5 контурных ячейковых упаковок по 6 таблеток или по 1, 2 или 3 контурные ячейковые упаковки по 10 таблеток вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии:

АО «АВВА РУС», Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатские Холмы, д. 30, корп. 9.

Тел./факс: +7 (495) 956-75-54.

avva-rus.ru

drug.safety@avva-rus.ru

Производитель:

АО «АВВА РУС», Россия, Кировская обл., г. Киров, ул. Луганская, д. 53А.

Тел.: +7 (8332) 25-12-29; +7 (495) 956-75-54.