

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Фарингосепт®

Регистрационный номер:

Торговое название: Фарингосепт®

Международное непатентованное название: Амбазон

Лекарственная форма: Таблетки для рассасывания со вкусом лимона.

Состав

Каждая таблетка для рассасывания со вкусом лимона содержит:

Активное вещество: амбазона моногидрат 10 мг

Вспомогательные вещества: сахароза 745 мг, лактозы моногидрат 150 мг, какао-бобов порошок 25 мг, повидон К-30 50 мг, ароматизатор лимонный 10 мг, стеариновая кислота 10 мг.

Описание:

Круглые, плоскоцилиндрические, скошенные к краю таблетки, коричневого цвета с неповрежденными краями и гравировкой «L» на одной стороне. Допускается наличие светлых и темных вкраплений.

Фармакотерапевтическая группа: Антисептическое средство.

Код АТХ: [R02AA01]

Фармакологические свойства*Фармакодинамика*

Обладает бактериостатическим действием. Оказывает местное противомикробное действие. Активен в отношении ряда грамположительных микроорганизмов (*Streptococcus haemolyticus*, *Streptococcus viridans*, *Pneumococcus*). На микрофлору кишечника не влияет.

Фармакокинетика

Оптимальная терапевтическая концентрация в слюне достигается на 3-4 день приема препарата при дозе 0,03-0,05 г/сут.

Показания к применению

Симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки: тонзиллит, гингивит, стоматит, фарингит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к амбазону и другим компонентам препарата; непереносимость лактозы, фруктозы, дефицит сахаразы/изомальтазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, дефицит лактазы; детский возраст до 3 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Беременным и кормящим женщинам следует посоветоваться с врачом перед применением препарата.

При беременности и в период грудного вскармливания применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы

Местно. Таблетки следует рассасывать до полного растворения (через 15-30 минут после еды). После применения таблеток следует воздержаться в течение 3 часов от питья и приема пищи.

Взрослым: по 4-5 таблеток (0,04-0,05 г) в сутки.

Детям: от 3 до 7 лет 3 таблетки (0,03 г) в сутки.

Курс лечения 3-4 дня.

Побочное действие

Аллергические реакции на компоненты препарата, кожная сыпь.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки амбазона неизвестны. Антидота нет. Возможная передозировка может привести к симптомам дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта. При применении чрезмерной дозы рекомендуется промыть желудок.

Взаимодействия с другими лекарственными средствами

Клинически значимых взаимодействий с другими препаратами не выявлено.

Особые указания

Не следует использовать препарат при наличии повышенной индивидуальной чувствительности к любому компоненту, входящему в состав препарата.

Препарат не рекомендуется применять пациентам с наследственной непереносимостью сахарозы и лактозы.

Увеличение дозы не оказывает большего клинического эффекта.

При сохранении симптомов или при появлении повышения температуры тела или головной боли следует обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность управлять автотранспортом и механизмами, а также на занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания со вкусом лимона 10 мг.

По 10 таблеток в блистер из алюминиевой фольги и темной прозрачной ПВХ-ПЭ-ПВДХ пленки.

По 10 таблеток в блистер из алюминиевой фольги и бесцветной прозрачной ПВХ-ПЭ-ПВДХ пленки.

По 1 или 2 блистера вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Препарат нельзя использовать позже указанной на упаковке даты.

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель

«Ранбакси Лабораториз Лимитед», Индия произведено С. К. ТЕРАПИЯ С.А., 124 Фабричи ул., Клуж-Напока, Румыния.

Ranbaxy Laboratories Limited, India manufactured by S.C. Terapia S.A., 124 Fabricii Street, Cluj-Napoca, Romania.

Претензии потребителей направлять в представительство компании Ранбакси Лабораториз Лимитед по адресу: 129223, г. Москва, пр. Мира, ВВЦ, Деловой Центр «Технопарк», строение 537/4, офис 45-48. Тел.: (495) 234-56-11/15, факс: (495) 234-56-19.

Генеральный директор ООО «АРС»
(по доверенности)



М. Ю. Тихонов