МИНЗДРАВ РОССИИ
ПN012596/03- 040621
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Амброгексал®

наименование лекарственного препарата

сироп, 3 мг/мл

лекарственная форма, дозировка

Лихтенхельдт ГмбХ Фармацойтише Фабрик,

Германия

наименование производителя, страна

Изменение № 2

040621

Дата внесения Изменения «____» _____ 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Показания к применению Острые и хронические заболевания дыхательных путей с выделением вязкой мокроты: • острый и хронический бронхит; • пневмония; • хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ);	**Показания к применению** Острые и хронические заболевания дыхательных путей с выделением вязкой мокроты: • острый и хронический бронхит; • пневмония; • хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ);

• бронхиальная астма с затруднением отхождения мокроты; • бронхоэктатическая болезнь; • лечение и профилактика респираторного дистресс-синдрома.	• бронхиальная астма с затруднением отхождения мокроты; • бронхоэктатическая болезнь.
Противопоказания • повышенная чувствительность к амброксолу или к любому из компонентов препарата; • беременность (I триместр); • период грудного вскармливания; • непереносимость фруктозы.	**Противопоказания** • повышенная чувствительность к амброксолу или к любому из компонентов препарата; • беременность (I триместр); • период грудного вскармливания. Сироп Амброгексал® (3 мг/мл) содержит 20 г 70 % сорбитола в пересчете на максимальную рекомендуемую суточную дозу (40 мл). Пациенты с редкой наследственной непереносимостью фруктозы не должны принимать этот препарат.

Руководитель группы поддержки
зарегистрированных продуктов
ЗАО «Сандоз» Припорова А.А.