МИНЗДРАВ РОССИИ
12 10 22
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Амброгексал®

наименование лекарственного препарата

сироп, 3 мг/мл

лекарственная форма, дозировка

Лихтенхельдт ГмбХ Фармацойтише Фабрик, Германия

наименование производителя, страна

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» 12 10 22 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Амброгексал® следует принимать внутрь после еды. 1 мерная ложка сиропа Амброгексал® (5 мл) содержит 15 мг гидрохлорида амброксола. *Взрослые и дети старше 12 лет:* по 2 мерные ложки 2-3 раза в день (60-90 мг гидрохлорида амброксола) в первые 2-3 дня приема, затем по 2	**Способ применения и дозы** Внутрь. **Возраст** / **Разовая доза** / **Кратность приема** Взрослым и детям старше 12 лет — 10 мл — 3 раза в сутки Детям от 6 до 12 лет — 5 мл — 2-3 раза в сутки

мерные ложки два раза в день (60 мг гидрохлорида амброксола в день).

В тяжелых случаях заболевания дозу не уменьшают в течение всего курса лечения. *Максимальная доза* - 4 мерные ложки 2 раза в день (120 мг гидрохлорида амброксола в день).

Дети от 5 до 12 лет: по 1 мерной ложке 2-3 раза в день (30-45 мг гидрохлорида амброксола).

Дети от 2 до 5 лет: по 1/2 мерной ложки 3 раза в день (22,5 мг гидрохлорида амброксола).

Дети младше 2 лет: по 1/2 мерной ложки 2 раза в день (15 мг гидрохлорида амброксола).

Детям младше 2 лет Амброгексал® назначают только под контролем врача.

Во время лечения необходимо употреблять много жидкости (соки, чай, вода) для усиления муколитического эффекта препарата.

Длительность терапии зависит от тяжести заболевания и определяется лечащим врачом. Без рекомендации

Детям от 2 до 6 лет	2,5 мл	3 раза в сутки
Детям до 2 лет	2,5 мл	2 раза в сутки

Амброгексал® в форме сиропа можно применять независимо от приема пищи.

Общие рекомендации по применению муколитиков

- Необходимо потреблять достаточное количество жидкости
- Необходимо избегать совместного приема с противокашлевыми препаратами
- Последний прием препарата должен быть не позднее 18 часов
- Выполнение комплекса упражнений (дыхательная гимнастика, детский дренирующий массаж) и активное откашливание способствуют удалению

врача не следует принимать Амброгексал® дольше 4-5 дней.	разжиженной мокроты из бронхолегочных путей. ***В случае сохранения симптомов заболевания в течение 4-5 дней от начала приема рекомендуется обратиться к врачу.***

Директор департамента
по разработке продуктов
АО «Сандоз»



Горожанин А.В.