

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Флавамед®

Таблетки, 30 мг

Берлин-Хеми АГ, Германия

Менарини-Фон Хейден ГмбХ, Германия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «_____» _____ 20__ г.


Старая реакция	Новая редакция
Взаимодействие с другими лекарственными средствами О клинически значимых нежелательных взаимодействиях амброксола с другими лекарственными средствами не сообщалось. Амброксол увеличивает проникновение в бронхиальный секрет амоксициллина, цефуроксима, эритромицина. Клиническая значимость данного взаимодействия не установлена. При применении с противокашлевыми препаратами возможно затруднение отхождения мокроты в	Взаимодействие с другими лекарственными средствами О клинически значимых нежелательных взаимодействиях амброксола с другими лекарственными средствами не сообщалось. Амброксол увеличивает проникновение в бронхиальный секрет амоксициллина, цефуроксима, эритромицина. Клиническая значимость данного взаимодействия не установлена. При применении амброксола с противокашлевыми препаратами возможно затруднение отхождения мокроты в результате подавления кашлевого рефлекса. Особенно это

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 03.11.2023 № 22462

(Вх. № 4367549)

Старая реакция	Новая редакция
результате подавления кашлевого рефлекса.	опасно для пациентов с респираторными заболеваниями, которые сопровождаются гиперсекрецией слизи, такими как муковисцидоз и бронхоэктатическая болезнь.

Руководитель отдела регистрации
и претензий



Харченко Н.Б.