ЛП-000627 от 19.12.2023

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 15.12.2023 № 26360
(Входящий МЗ №4261664)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

СМОФКабивен® периферический

наименование лекарственного препарата

Эмульсия для инфузий

лекарственная форма, дозировка

Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ, Германия

наименование юридического лица на имя, которого выдано регистрационное удостоверение, адрес

Фрезениус Каби АБ, Швеция

наименование производителя, страна

Изменение № 1 к Инструкции ЛП-000627-040423

Дата внесения Изменения «____» _____ 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Не применимо. Препарат применяется для лечения пациентов, находящихся в отделениях реанимации и интенсивной терапии.	**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами** Не применимо.
Форма выпуска Эмульсия для инфузий По 1206 мл, 1448 мл или 1904 мл смеси в трёхкамерном пластиковом контейнере «Биофин», каждая камера которого	**Форма выпуска** Эмульсия для инфузий По 1206 мл, 1448 мл или 1904 мл смеси в трёхкамерном пластиковом контейнере «Биофин», каждая камера которого

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
(Входящий МЗ №4261664)

Старая редакция	Новая редакция
содержит один из растворов: камера, содержащая 10% раствор аминокислот с электролитами (380 мл, 456 мл или 600 мл соответственно); камера, содержащая 13 % раствор декстрозы (656 мл, 788 мл или 1036 мл соответственно); камера, содержащая 20% жировую эмульсию (170 мл, 204 мл или 268 мл соответственно). Каждый контейнер (из полипропилена) вместе с антиокислителем помещают в наружный пластиковый мешок (из полиэтилена). По 4 мешка (контейнера) вместе с инструкцией по применению помещают в картонную коробку (для стационаров).	содержит один из растворов: камера, содержащая 10% раствор аминокислот с электролитами (380 мл, 456 мл или 600 мл соответственно); камера, содержащая 13 % раствор декстрозы (656 мл, 788 мл или 1036 мл соответственно); камера, содержащая 20% жировую эмульсию (170 мл, 204 мл или 268 мл соответственно). Каждый контейнер (из полипропилена) вместе с антиокислителем помещают в наружный пластиковый мешок (из полиэтилена). По 4 мешка (контейнера) вместе с инструкцией по применению помещают в картонную коробку.
Условия отпуска Для стационаров.	**Условия отпуска** Отпускают по рецепту.

Менеджер по регистрации

ООО «Фрезениус Каби» Т.А.Таланова