ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению
ПРЕПАРАТА

Натрия пара-аминосалицилат гранулы,
покрытые оболочкой, 800 мг/г

Регистрационный номер: ЛС-000230

Изменение № 1

Срок введения Изменения с «10» 06 2015г.

Старая редакция	Новая редакция
1	2
Состав: *активное вещество:* натрия пара-аминосалицилат - 3.2 г *вспомогательные вещества:* этилцеллюлоза, поливинилпирролидон среднемолекулярный (повидон), целлюлоза микрокристаллическая, сахар молочный (лактоза), шеллак, ойдрагит, тропеолин 0- до 4г.	**Состав:** 4 г в пакете *активное вещество:* натрия пара-аминосалицилат – 3,2 г *вспомогательные вещества:* этилцеллюлоза, поливинилпирролидон среднемолекулярный (повидон), целлюлоза микрокристаллическая, сахар молочный (лактоза), шеллак, ойдрагит, тропеолин 0 - до 4 г. 5 г в пакете *активное вещество:* натрия пара-аминосалицилат – 4,0 г *вспомогательные вещества:* этилцеллюлоза, поливинилпирролидон среднемолекулярный (повидон), целлюлоза микрокристаллическая, сахар молочный (лактоза), шеллак, ойдрагит, тропеолин 0 - до 5 г.
Форма выпуска: Гранулы, покрытые оболочкой 800мг/1г По 4 г в термосвариваемые пакеты. По 1, 50, 100 или 1000 пакетов вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.	**Форма выпуска:** Гранулы, покрытые оболочкой 800 мг/г По 4 г, 5 г в термосвариваемые пакеты. По 1, 10, 50, 100 или 1000 пакетов вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.
Фармакоджамжа: Натрия пара-аминосалицилат обладает бактериостатическим действием в отношении *Mycobacterium tuberculosis.* Механизм действия связан с угнетением синтеза фолиевой кислоты и с подавлением образования микобактина, компонента микобактериальной стенки, что приводит к уменьшению за-	**Фармакодинамика:** Натрия пара-аминосалицилат обладает бактериостатическим действием в отношении *Mycobacterium tuberculosis.* Механизм действия связан с угнетением синтеза фолиевой кислоты и с подавлением образования микобактина, компонента микобактериальной стенки, что приводит к уменьшению за-

хвата железа *M. tuberculosis.* Натрия пара-аминосалицилат действует на микробактерии, находящиеся в состоянии активного размножения, и практически не действует на микробактерии в стадии покоя. Слабо влияет на возбудителя, располагающегося внутриклеточно. Натрия пара-аминосалицилат активен только в отношении *M. Tuberculosis.* Не действует на другие нетуберкулёзные микобактерии. Натрия пара-аминосалицилат уменьшает вероятность развития бактериальной устойчивости к стрептомицину и изониазиду. **Производитель:** ЗАО «ЗиО-Здоровье» Россия, 142103 Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, 2. Тел.: (095) 727-92-87, 727-92-30	хвата железа *M. tuberculosis.* Натрия пара-аминосалицилат действует на микробактерии, находящиеся в состоянии активного размножения, и практически не действует на микробактерии в стадии покоя. Слабо влияет на возбудителя, располагающегося внутриклеточно. Натрия пара-аминосалицилат активен только в отношении *M. Tuberculosis.* Не действует на другие нетуберкулёзные микобактерии. Натрия пара-аминосалицилат уменьшает вероятность развития бактериальной устойчивости к стрептомицину и изониазиду. **Производитель:** ЗАО «ЗиО-Здоровье» Россия, 142103 Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, 2. Тел.: (495) 642-05-42 Факс: (495) 642-05-43

Директор по качеству
ЗАО «ЗиО-Здоровье» О.В. Столярова

«____»_____20 _ г.