МИНЗДРАВ РОССИИ
ПП-002989- 250220
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ПАСК,

гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 600 мг/г, 800 мг/г

С.П. Инкомед Пвт. Лтд., Индия / ООО «ФармКонцепт», Россия

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» 250220 20____ г

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 600 мг/г и 800 мг/г. ***При производстве препарата на предприятии С.П. Инкомед Пвт. Лтд., Индия*** *Для дозировки 600 мг/г:* По 4 г, 6,67 г, 6,70 г или 8,34 г в саше из буфлена. По 10 саше (по 4 г, 6,67 г, 6,70 г или 8,34 г) или 12 саше (по 4 г) вместе с инструкцией по медицинскому применению в пачку картонную. По 100 г или 500 г в пакет из полиэтилена низкой плотности. На пакет наклеивают этикетку. По 1 пакету вместе с мерной ложкой в банку из полиэтилена высокой плотности с алюминиевой мембраной и навинчивающейся крышкой. На банку наклеивают этикетку. Банки вместе с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в групповую упаковку. *Для дозировки 800 мг/г:* По 4 г или 5 г в саше из буфлена. По 10 саше	**Форма выпуска** Гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 600 мг/г и 800 мг/г. *Для дозировки 600 мг/г:* По 4 г, 6,67 г, 6,70 г или 8,34 г в саше из материала комбинированного на основе алюминиевой фольги. По 10 саше (по 4 г, 6,67 г, 6,70 г или 8,34 г) или 12 саше (по 4 г) вместе с инструкцией по медицинскому применению в пачку картонную. По 100 г или 500 г в пакет из пленки на основе ПВХ. На пакет наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящуюся этикетку. По 1 пакету вместе с мерной ложкой в банку полимерную в комплекте с крышкой. На банку наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящуюся этикетку. Банки вместе с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в групповую упаковку. *Для дозировки 800 мг/г:* По 4 г или 5 г в саше из материала

Старая редакция	Новая редакция
(по 4 г или 5 г) или 12 саше (по 4 г) вместе с инструкцией по медицинскому применению в пачку картонную. По 100 г или 500 г в пакет из полиэтилена низкой плотности. На пакет наклеивают этикетку. По 1 пакету вместе с мерной ложкой в банку из полиэтилена высокой плотности с алюминиевой мембраной и навинчивающейся крышкой. На банку наклеивают этикетку. Банки вместе с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в групповую упаковку. ***При упаковке препарата на предприятии ООО «ФармКонцепт», Россия*** По 10 или 12 саше (по 4 г) вместе с инструкцией по медицинскому применению в пачку картонную. По 10 саше (по 6,67 г, 6,70 г или 8,34 г для дозировки 600 мг/г) вместе с инструкцией по медицинскому применению в пачку картонную. По 10 саше (по 5 г для дозировки 800 мг/г) вместе с инструкцией по медицинскому применению в пачку картонную. Одну банку вместе с инструкцией по медицинскому применению в пачку картонную. ***При производстве препарата на предприятии ООО «ФармКонцепт», Россия*** *Для дозировки 600 мг/г:* По 4 г, 6,67 г, 6,70 г или 8,34 г в саше из материала комбинированного на основе алюминиевой фольги. По 10 саше (по 4 г, 6,67 г, 6,70 г или 8,34 г) или 12 саше (по 4 г) вместе	комбинированного на основе алюминиевой фольги. По 10 саше (по 4 г или 5 г) или 12 саше (по 4 г) вместе с инструкцией по медицинскому применению в пачку картонную. По 100 г или 500 г в пакет из пленки на основе ПВХ. На пакет наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящуюся этикетку. По 1 пакету вместе с мерной ложкой в банку полимерную в комплекте с крышкой. На банку наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящуюся этикетку. Банки вместе с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в групповую упаковку.

Старая редакция	Новая редакция
с инструкцией по медицинскому применению в пачку картонную. По 100 г или 500 г в пакет из пленки на основе ПВХ. На пакет наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящуюся этикетку. По 1 пакету вместе с мерной ложкой в банку полимерную в комплекте с крышкой. На банку наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящуюся этикетку. Банки вместе с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в групповую упаковку. *Для дозировки 800 мг/г:* По 4 г или 5 г в саше из материала комбинированного на основе алюминиевой фольги. По 10 саше (по 4 г или 5 г) или 12 саше (по 4 г) вместе с инструкцией по медицинскому применению в пачку картонную. По 100 г или 500 г в пакет из пленки на основе ПВХ. На пакет наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящуюся этикетку. По 1 пакету вместе с мерной ложкой в банку полимерную в комплекте с крышкой. На банку наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящуюся этикетку. Банки вместе с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в групповую упаковку. **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** 1. При производстве препарата на предприятии С.П. Инкомед Пвт. Лтд., Индия **Производитель:** ***С.П. Инкомед Пвт. Лтд., Индия***	**Производитель:** *ООО «ФармКонцепт», Россия* 171261, Тверская обл., Конаковский район, пгт Редкино, ул. Заводская, д. 1б

Старая редакция	Новая редакция
323/1, Централ Хоп Таун, Камп роуд, Дехрадун-248197 **Упаковано:** ***С.П. Инкомед Пвт. Лтд., Индия*** 323/1, Централ Хоп Таун, Камп роуд, Дехрадун-248197 или ***ООО «ФармКонцепт», Россия*** 171261, Тверская обл., Конаковский район, пгт Редкино, ул. Заводская, д. 1 б 2. При производстве препарата на предприятии ООО «ФармКонцепт», Россия ***Произвоитель/Упаковано:*** ***ООО «ФармКонцепт», Россия*** 171261, Тверская обл., Конаковский район, пгт Редкино, ул. Заводская, д. 1 б	

Генеральный директор
ООО «С.П.ИНКОМЕД» Рай Панкадж Кумар