МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП 002695-110517
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

АПРОВАСК®

наименование лекарственного препарата

таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
5 мг + 150 мг, 10 мг + 150 мг, 5 мг + 300 мг, 10 мг + 300 мг

лекарственная форма, дозировка

САНОФИ-АВЕНТИС де Мексико С.А. де С.В., Мексика

наименование производителя, страна

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» _____ 20___ г. 110517

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы **Взрослые** Препарат предназначен для приема внутрь. Таблетку проглатывают, запивая водой. Препарат Апроваск® может приниматься как одновременно с приемом пищи, так и натощак (то есть независимо от времени приема пищи). Обычно начальная и поддерживающая доза препарата Апроваск® – 1 таблетка в сутки. Препарат Апроваск® следует применять у пациентов, у которых не удается достигнуть целевых значений АД при монотерапии ирбесартаном или монотерапии	**Способ применения и дозы** **Взрослые** Внутрь, запивая водой, вне зависимости от времени приема пищи. Начальная и поддерживающая доза препарата Апроваск® – 1 таблетка в сутки. Препарат Апроваск® следует применять у пациентов, у которых не удается достигнуть целевых значений АД при монотерапии ирбесартаном или монотерапии амлодипином, или для продолжения лечения пациентов, уже принимающих ирбесартан и амлодипин в виде отдельных таблеток. Дозы должны подбираться индивидуально, сначала с

амлодипином, или для продолжения лечения пациентов, уже принимающих ирбесартан и амлодипин в виде отдельных таблеток. Дозы должны подбираться индивидуально, сначала с применением отдельных препаратов ирбесартана и амлодипина. Дозы подбираются в зависимости от реакции АД на проводимую терапию и целевого значения АД. Максимальная рекомендованная доза препарата Апроваск® составляет 150 мг/10 мг или 300 мг/10 мг в сутки (в связи с тем, что максимальная суточная доза амлодипина составляет 10 мг). **Дети** Безопасность и эффективность препарата Апроваск® не установлены. **Пациенты пожилого возраста и пациенты с нарушением функции почек** Обычно нет необходимости в снижении доз у пациентов пожилого возраста (см. раздел «Фармакодинамика») и пациентов с нарушениями функции почек. **Пациенты с нарушением функции печени** Препарат Апроваск® должен применяться с осторожностью, в связи с наличием в составе препарата амлодипина (см. разделы «С осторожностью» и «Особые указания»).	применением отдельных препаратов ирбесартана и амлодипина. Дозы подбираются в зависимости от реакции АД на проводимую терапию и целевого значения АД. Максимальная рекомендованная доза препарата – 150 мг/10 мг или 300 мг/10 мг в сутки (в связи с тем, что максимальная суточная доза амлодипина составляет 10 мг). **Дети** Безопасность и эффективность препарата Апроваск® не установлены. **Пациенты пожилого возраста и пациенты с нарушением функции почек** Коррекция дозы не требуется. **Пациенты с нарушением функции печени** Препарат Апроваск® должен применяться с осторожностью, в связи с наличием в составе препарата амлодипина (см. разделы «С осторожностью» и «Особые указания»).

Старший менеджер по регистрации Айриян И.К.