

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Аммиак

Регистрационный номер:

Торговое наименование. Аммиак.

Международное непатентованное или группировочное наименование. Аммиак.

Лекарственная форма. Раствор для наружного применения и ингаляций.

Состав на 100 мл:

Действующее вещество:

Аммиак водный концентрированный - 44 мл

(эквивалентно содержанию аммиака 10 г)

Вспомогательное вещество:

Вода очищенная - до 100 мл

Описание

Бесцветная прозрачная летучая жидкость с резким запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы; стимуляторы дыхания.

Код АТХ: R07AB

Фармакологические свойства

Аналептическое, антисептическое средство. При вдыхании вызывает раздражение слизистой оболочки дыхательных путей и рефлекторно возбуждает дыхательный и сосудодвигательный центры, обладает раздражающим действием на кожу. В высоких концентрациях вызывает рефлекторную остановку дыхания. Оказывает дезинфицирующее действие на кожу. При длительном контакте раздражающее действие на кожу может

переходить в прижигающее (коагуляция белков) с развитием гиперемии, отека и болезненности.

Фармакокинетика

Быстро выводится при любом способе введения, главным образом легкими и бронхиальными железами.

Показания к применению

Обморок, дезинфекция кожи рук, нейтрализация кислых токсинов при укусах насекомых (муравьи, комары, осы, пчелы).

Противопоказания

Гиперчувствительность к аммиаку; при наружном применении – нарушение целостности кожных покровов, воспалительные заболевания кожи (в т.ч. дерматит, экзема) и другие заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения.

С осторожностью

Беременность, период грудного вскармливания, детский возраст.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Безопасность применения препарата при беременности и в период грудного вскармливания не установлена. Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно только по назначению врача, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы

Ингаляционно, наружно. Для возбуждения дыхания и выведения больных из обморочного состояния, ингаляционно, осторожно (на 0,5-1 сек) подносят к носовым отверстиям смоченный препаратом кусочек ваты.

В хирургической практике (для дезинфекции) используют для мытья рук раствор аммиака (25 мл на 5 л теплой кипяченой воды).

При укусах насекомых применяют наружно в виде примочек (продолжительность – до 30 сек).

Побочное действие

Остановка дыхания (рефлекторная, при вдыхании в высокой концентрации), гиперемия, отечность и болезненность кожи в месте нанесения. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна. При чрезмерном вдыхании паров аммиака – рефлекторная остановка дыхания. При чрезмерном наружном применении возможно усиление побочных эффектов (раздражение, дерматит, экзема в месте нанесения препарата).

Лечение: симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Нейтрализует кислоты.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Раствор для наружного применения и ингаляций 10 %.

По 10, 25, 50 мл препарата во флаконы-капельницы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками и навинчиваемыми крышками из полиэтилена высокого или низкого давления.

По 10, 25, 40, 50, 90 и 100 мл препарата во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробками из полиэтилена высокого или низкого давления и навинчиваемыми крышками из полиэтилена высокого или низкого давления.

По 10, 25, 40, 50, 90 и 100 мл препарата во флаконы или флаконы-капельницы коричневого стекла, укупоренные средствами укупорочными полимерными.

По 10, 25, 40, 50, 90 и 100 мл препарата во флаконы или флаконы-капельницы из полиэтилена высокого или низкого давления со средствами укупорочными.

По 10, 25, 40, 50, 90 и 100 мл во флаконы из полиэтилентерефталата, закупоренные колпачками винтовыми из полиэтилена высокого давления.

Допускается полный текст инструкции по применению наносить на пачку.

Каждый флакон или флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Допускается упаковка флаконов или флаконов-капельниц без пачки от 30 до 150 штук вместе с равным количеством инструкций по применению в групповую упаковку (для стационаров).

По 9, 18 кг в канистры из полиэтилена низкого давления с навинчиваемыми крышками и с инструкциями по применению (для стационаров).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель/Организация, принимающая претензии:

АО «Ивановская фармацевтическая фабрика», Россия

153007, Ивановская обл., г.о. Иваново, г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, д. 19А

Тел.: 8 (493) 233-42-73

e-mail: ivff@yandex.ru