ЛП-№(011931)-(РГ-RU) от 03.10.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.09.2025 № 24485
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

НАШАТЫРНО-АНИСОВЫЕ КАПЛИ

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Нашатырно-анисовые капли

Международное непатентованное или группировочное наименование: аммиак + аниса плодов масло

Лекарственная форма: раствор для приема внутрь спиртовой

Состав:

100 мл содержат:

Действующие вещества: аниса плодов масло - 2,81 г, аммиака раствор 10 % - 15 мл, что эквивалентно содержанию 1,5 г аммиака.

Вспомогательное вещество: этанол (спирт этиловый) 90 % - до 100 мл.

Описание: прозрачная, бесцветная или слегка желтоватого цвета жидкость с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях; отхаркивающие средства, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами; отхаркивающие средства

Код АТХ: R05CA10

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Препарат рефлекторно влияет на бронхи и бронхиальные железы, стимулируя моторную функцию мерцательного эпителия и бронхиол, что способствует продвижению и выведению мокроты из нижних и верхних отделов дыхательных путей. Этот эффект сочетается с усилением секреции бронхиальных желез и некоторым уменьшением вязкости мокроты.

Анисовое масло обладает отхаркивающим действием, обусловленным содержанием в масле анетола, который способствует рефлекторному возбуждению дыхания, повышению активности реснитчатого эпителия дыхательных путей и усилению секреции слизистых оболочек гортани, трахеи, бронхов. Аммиак обладает раздражающим действием, которое

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.09.2025 № 24485
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

приводит к возбуждению окончаний чувствительных нервов верхних дыхательных путей и рефлекторной стимуляции дыхательного центра.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению

В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей (в том числе трахеит, трахеобронхит, бронхит).

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- гастрит;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- детский возраст до 1 года.

С осторожностью

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, эпилепсия, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст с 1 года.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно в случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь, 2-3 раза в день. Перед применением препарат следует разводить в небольшом количестве воды (1/4-1/2 стакана).

Препарат следует применять только в разведенном виде!

Разовая доза для взрослых составляет 10-15 капель, детям с 1 года назначают на прием столько капель, сколько лет ребенку. Курс лечения составляет 1-2 недели. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача. В период применения препарата рекомендуется обильное теплое питье. Если в период лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.09.2025 № 24485
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны кожные аллергические реакции (кожный зуд, кожная сыпь, гиперемия кожных покровов), тошнота, рвота.

Применение препарата в неразведенном виде может вызвать ожоги слизистых оболочек.

Если при применении препарата наблюдаются нежелательные реакции, или Вы заметили побочные эффекты, не указанные в данной инструкции, прекратите применение препарата и обратитесь к врачу.

Передозировка

Симптомы

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендованные, возможно появление тошноты.

Лечение

Симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Нашатырно-анисовые капли проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Препарат следует применять только в разведенном виде! Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата для взрослых составляет 0,18 г, в максимальной суточной дозе – 0,54 г. В одной капле препарата содержится 0,012 г абсолютного этилового спирта.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.09.2025 № 24485
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Форма выпуска

Раствор для приема внутрь спиртовой.

По 25, 40 мл препарата во флаконы оранжевого стекла, укупоренные полиэтиленовыми пробками или пробками-капельницами с пластмассовыми крышками навинчиваемыми или навинчиваемыми с контролем первого вскрытия, также допускается использование крышек-капельниц или крышек без пробки.

На флаконы наклеивают этикетку из бумаги или самоклеящуюся этикетку.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Допускается вложение полимерной ложки мерной в каждую пачку.

По 10, 16, 20, 30, 40, 56, 112 флаконов по 25, 40 мл с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в коробку картонную или ящик из гофрированного картона (для стационаров).

Условия хранения

При температуре от 8 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Россия, 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

Производитель

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Россия, 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

Организация, принимающая претензии потребителей

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.09.2025 № 24485
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Россия, 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

Тел.: (8332) 22-01-26

E-mail: kachestvo-s@k-ff.ru