МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ГРУДНОЙ ЭЛИКСИР

Регистрационный номер:
Торговое наименование Грудной эликсир
Международное непатентованное или группировочное наименование Аммиак + Аниса плодов масло + Солодки корней экстракт
Лекарственная форма Эликсир

МИНЗДРАВ РОССИИ
021122
СОГЛАСОВАНО

Состав
Действующие вещества:

Солодки корней экстракт (Солодки экстракт густой)	- 20,7 г
Аниса плодов масло (Анисовое масло)	- 0,34 г
Аммиака раствор концентрированный 25 % [эквивалентно 0,345 г аммиака]	- 1,38 г

Вспомогательные вещества:

Этанол (спирт этиловый) 90 %	- 20,41 мл
Вода очищенная	до 100 мл

Описание Жидкость коричневого цвета с запахом аммиака и анисового масла. Допускается в процессе хранения выпадение осадка.
Фармакотерапевтическая группа Отхаркивающее средство растительного происхождения.
Код АТХ: R05CA10
Фармакологические свойства Отхаркивающий эффект грудного эликсира обусловлен действием входящих в него компонентов:
- солодки экстракт густой обладает противовоспалительным и отхаркивающим свойствами, которые связаны с содержанием в корнях глицирризина, стимулирующего активность реснитчатого эпителия в трахее и бронхах, а также усиливающего секреторную функцию слизистых оболочек верхних дыхательных путей;
- анисовое масло обладает отхаркивающим действием, обусловленным содержанием в масле анетола, который способствует рефлекторному возбуждению дыхания, повышению активности реснитчатого эпителия дыхательных путей и усилению секреции слизистых оболочек гортани, трахеи, бронхов;
- аммиак обладает раздражающим действием, которое приводит к возбуждению окончаний чувствительных нервов верхних дыхательных путей и рефлекторной стимуляции центра дыхания.

Показания к применению В качестве отхаркивающего средства при инфекционно-воспалительных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (в том числе трахеит, трахеобронхит, бронхит).
Противопоказания Повышенная чувствительность к компонентам препарата, бронхиальная астма, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, беременность, период грудного вскармливания.
С осторожностью Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, детский возраст, пациенты со склонностью к развитию лекарственной зависимости, эпилепсии.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания

Способ применения и дозы Внутрь, 3-4 раза в день. Взрослым - по 20-40 капель, детям назначают на прием столько капель, сколько лет ребенку. Перед применением следует разводить в небольшом количестве воды.

Курс лечения 7 - 10 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие Возможны аллергические реакции, в отдельных случаях может наблюдаться диарея.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка При длительном применении с превышением указанных дозировок возможны гипокалиемия, повышение артериального давления, появление периферических отеков вследствие нарушения водно-солевого обмена.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами При необходимости можно применять в сочетании с антибиотиками и другими лекарственными средствами. Не следует применять одновременно с противокашлевыми препаратами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания В составе препарата содержится спирт этиловый 90 %. Содержание абсолютного спирта этилового в 1 капле препарата составляет 0,0075 г, в максимальной разовой дозе для взрослых до 0,3 г, в максимальной суточной дозе до 1,2 г.

При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 7 дней, следует сообщить об этом лечащему врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами
В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятиях другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска Эликсир.

25 мл во флаконы, флаконы-капельницы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полимерными или пробками-капельницами, навинчиваемыми пластмассовыми крышками.

1 флакон, флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку, изготовленную из картона.

1 флакон, флакон-капельницу помещают в пачку, изготовленную из картона, на которую нанесен полный текст инструкции по применению.

Условия хранения При температуре от 15 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности 3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска Отпускают без рецепта.

Производитель/ Владелец регистрационного удостоверения/ Организация, принимающая претензии от потребителей

ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика»,
Россия, 170024, г. Тверь, Старицкое шоссе, д. 2
Тел./факс (4822) 44-41-19

Исполнительный директор **Д.Е. Агейчик**

ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика» **«13» 10 2022 г.**