

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**ЛОКИНАЛ ИНТИМ**

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** Локинал Интим

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** аммония  
глицирризинат

**Лекарственная форма:** спрей для местного и наружного применения

**Состав:**

1 мл содержит:

*Действующее вещество:* аммония глицирризинат (глицирам) - 1,0 мг.

*Вспомогательные вещества:* яблочная кислота - 30,0 мг; фумаровая кислота - 20,0 мг;  
аскорбиновая кислота - 3,0 мг; фолиевая кислота - 0,8 мг; пропиленгликоль - 500,0 мг;  
твин-80 (полисорбат-80) - 9,0 мг; вода очищенная - до 1,0 мл.

**Описание:** прозрачный раствор от светло-желтого до светло-коричневого цвета, с  
характерным запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** антибиотики и противомикробные средства,  
применяемые в дерматологии; противомикробные средства для наружного применения;  
противовирусные средства.

**Код АТХ:** D06BB

**Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика**

Действующим веществом препарата является активированная глицирризиновая кислота,  
получаемая путем экстракции из растительного сырья (корня солодки).

Активированная глицирризиновая кислота обладает комплексным воздействием, которое  
включает иммуностимулирующее, противовирусное, противовоспалительное,  
противозудное и регенерирующее.

Активированная глицирризиновая кислота индуцирует выработку собственных  
интерферонов.

Иммуностимулирующий эффект проявляется повышением числа и активности Т-

лимфоцитов, уменьшением концентрации иммуноглобулина G и увеличением концентрации иммуноглобулинов A и M.

Активированная глицирризиновая кислота обладает противовирусным действием на разные типы ДНК и РНК вирусов *in vitro* и *in vivo* (*Varicella Zoster*; вирус простого герпеса типа 1 и 2; цитомегаловирус, различные типы вируса папилломы человека, в том числе онкогенные). Активированная глицирризиновая кислота прерывает репликацию вирусов на ранних стадиях, вызывает выход вириона из капсида, тем самым, не допуская его проникновение в клетки. Активированная глицирризиновая кислота инактивирует указанные вирусы в нетоксичных для нормально функционирующих клеток концентрациях. Мутантные штаммы вирусов, резистентные к ацикловиру и йодоуридину, также высокочувствительны к глицирризиновой кислоте, как и не мутантные штаммы. Противовоспалительная активность активированной глицирризиновой кислоты сочетается со стимулирующим влиянием на гуморальные и клеточные факторы иммунитета. Активированная глицирризиновая кислота существенно тормозит выброс кининов и синтез простагландинов клетками соединительной ткани в зоне воспаления. Регенерирующее действие обусловлено улучшением репарации кожи и слизистых.

### **Фармакокинетика**

При наружном и местном применении активированная глицирризиновая кислота депонируется в очагах поражения. Системная абсорбция происходит медленно. Препарат обнаруживается в крови в следовых количествах.

### **Показания к применению**

- лечение вирусной инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, в том числе бессимптомное выделение вируса папилломы человека высокого онкогенного риска в составе комплексной терапии;
- лечение вирусной инфекции, вызванной вирусом простого герпеса I и II типов в составе комплексной терапии;
- лечение вирусной инфекции, вызванной вирусом *Varicella Zoster* (опоясывающий лишай) в составе комплексной терапии;
- лечение вирусной инфекции, вызванной цитомегаловирусом в составе комплексной терапии;
- профилактика рецидивов вирусных инфекций, вызванных вирусом простого герпеса I и II типов, вирусом *Varicella Zoster*, вирусом папилломы человека, цитомегаловирусом;
- профилактика и лечение остроконечных кондилом и патологии шейки матки,

вызванной вирусом папилломы человека, цитомегаловирусом,

- профилактика и лечение состояний, сопровождающихся снижением местного иммунитета, в том числе неспецифического вульвовагинита, кандидозного вульвовагинита и бактериального вагиноза, в составе комплексной терапии;
- при явлениях дискомфорта в области половых органов, сопровождающихся зудом, жжением и сухостью слизистых оболочек, в том числе после полового акта;
- при явлениях дискомфорта в области половых органов, сопровождающихся зудом, жжением и сухостью слизистых оболочек при недостаточности функции яичников.

### **Противопоказания**

Гиперчувствительность к аммония глицирризинату и/или к любому из вспомогательных веществ.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания возможно, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

### **Способ применения и дозы**

Наружно, интравагинально и интрауретрально.

Перед применением баллон встряхнуть.

При применении баллон держать в вертикальном положении.

При наружном применении препарат наносится на всю пораженную поверхность кожи с расстояния 4-5 см путем однократного нажатия клапана, в течение 2-3 сек.

Для интравагинального применения препарата прилагается специальная насадка с распылителем. Снять клапан с баллона пульверизатора и надеть клапан насадки. Затем насадку ввести во влагалище и произвести впрыскивание путем однократного нажатия насадки, в течение 2-3 сек.

При интрауретральном применении препарат впрыскивается в наружное отверстие мочеиспускательного канала однократным нажатием клапана пульверизатора в течение 2- 3 сек.

*При герпесвирусной инфекции I типа, опоясывающем лишае* препарат рекомендуется применять 6 раз в день на очаг поражения в течение 5 дней. При упорном течении инфекционного процесса срок лечения продлевается до полного исчезновения симптомов заболевания.

*При герпесвирусной инфекции II типа (генитальный герпес), цитомегаловирусной*

*инфекции* рекомендуется применять 5 раз в день в течение 14 дней наружно и интравагинально, после купирования рецидива - наружно и интравагинально 3 раза в день в течение 10 дней.

*С целью профилактики рецидивов генитального герпеса и цитомегаловирусной инфекции* препарат рекомендуется применять наружно и интравагинально с 18-20 дня менструального цикла до окончания менструации 2 раза в день утром и вечером.

*При папилломавирусной инфекции* препарат рекомендуется применять:

- до удаления кондилом - 3 раза в сутки в течение всего периода этиотропной терапии;
- на фоне деструкции - 5 раз в сутки в течение 10 дней и больше до полного заживления;
- для профилактики ближайших рецидивов 3 раза в день в течение 1 месяца.

*Для профилактики прогрессирования папилломавирусной инфекции* рекомендуется применять до и после полового акта, а так же при возникновении провоцирующих факторов (стресс, переутомление, респираторные вирусные инфекции, нарушение микрофлоры, прием антибиотиков, цитостатиков) - 3 раза в день интравагинально и наружно в течение всего периода воздействия провоцирующих факторов.

*При бактериальном вагинозе, неспецифическом вульвовагините, и кандидозном вульвовагините:* препарат рекомендуется применять интравагинально 3-4 раза в день в течение 7-10 дней. При необходимости курс лечения повторить через 10 дней. При возникновении провоцирующих факторов (респираторные вирусные инфекции, прием антибиотиков, цитостатиков) - 3 раза в день интравагинально и наружно в течение всего периода воздействия провоцирующих факторов.

*При явлениях дискомфорта в области половых органов, сопровождающихся зудом, жжением и сухостью слизистых оболочек:* 2 раза в день (утром и вечером) в течение 2-3 недель. С целью профилактики состояний дискомфорта применять регулярно после полового акта.

*В качестве профилактического противовирусного средства,* препарат рекомендуется применять до и после полового акта.

### **Побочное действие**

Аллергические реакции: крапивница, контактный дерматит.

### **Передозировка**

Случаев передозировки не выявлено.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не выявлено взаимодействия с основными группами лекарственных препаратов, применяемых для комплексного лечения при указанных заболеваниях (антибиотики и антисептики; противовоспалительные и обезболивающие средства).

Обнаружен синергизм при одновременном применении активированной глицирризиновой кислоты и других противовирусных препаратов, в частности, производных ацикловира, йодоуридина; интерферона и других иммуномодуляторов.

### **Особые указания**

Насадку промывают кипяченой водой с мылом и хранят в прилагаемой полиэтиленовой упаковке.

Конструкция насадки позволяет сохранить эффект равномерного орошения шейки матки и стенок влагалища.

Для использования в условиях стационара интравагинальное орошение препаратом в зеркалах можно производить без насадки.

Для эффективного действия не требуется предварительного промывания участка нанесения.

В случае проявления признаков непереносимости использование препарата прекратить.

### **Вспомогательные вещества**

Препарат Локинал Интим содержит пропиленгликоль, который может раздражать кожу.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

### **Форма выпуска**

Спрей для местного и наружного применения 0,1 %.

По 15, 60 мл препарата во флаконы полиэтиленовые с навинчиваемой насадкой-распылителем.

Допускается вложение в каждую пачку отдельно лежащей распылительной насадки для интравагинального применения, навинчиваемой или надевающейся на канюлю распылителя, в пакете полиэтиленовом.

На флаконы наклеивают этикетку из бумаги или самоклеящуюся этикетку.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

**Условия хранения**

При температуре от 15 до 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

4 года.

Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Держатель регистрационного удостоверения**

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Россия, 610000, г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

**Производитель**

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Россия, 610000, г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

**Организация, принимающая претензии потребителей**

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Россия, 610000, г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

Тел./факс (8332) 65-46-64, 65-35-10

E-mail: kachestvo-s@k-ff.ru