

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

РЕГЛИСАМ

Регистрационный номер:**Торговое наименование:** Реглисам**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Аммония глицирризинат**Лекарственная форма:** таблетки**Состав на одну таблетку***Активное вещество*

Глицирам (Аммония глицирризинат) в пересчете на 100 % вещество	– 0,05 г
---	----------

Вспомогательные вещества

Натрия хлорид	– 0,100 г
Крахмал картофельный	– 0,008 г
Тальк	– 0,001 г
Кальция стеарат	– 0,001 г

Описание

Таблетки круглые, плоскоцилиндрической формы с фаской, от белого с желтоватым оттенком до желтого с коричневатым оттенком цвета с вкраплениями более темного цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы.

Код АТХ

R07AX.

Фармакологические свойства

Оказывает противовоспалительное, умеренное отхаркивающее действие, стимулирует функцию коры надпочечников.

Показания к применению

В качестве отхаркивающего средства в составе комплексной терапии при заболеваниях дыхательных путей с трудно отделяемой мокротой (в том числе при легких формах бронхиальной астмы).

Экзема, аллергический дерматит, болезнь Аддисона (диэнцефально-гипофизарные формы, как самостоятельно, так и в сочетании с адренокортикотропным гормоном), астенические состояния и гипотонический синдром, гипофункция коры надпочечников на фоне длительной терапии глюкокортикостероидами, в том числе профилактика синдрома «отмены» в период прекращения лечения глюкокортикостероидами или снижения их дозировки (в составе комплексной терапии).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелые органические поражения сердца и паренхиматозных органов, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 10 лет.

Способ применения и дозы

Внутрь, за 30 минут до еды или через 30 минут после еды. Взрослым и детям старше 10 лет – по 1-2 таблетки 2 раза в день. В более тяжелых случаях разовая доза препарата составляет 2 таблетки 3-6 раз в день. Длительность лечения – от 2 недель до 6 месяцев. Возможность повторных курсов, дозы препарата и длительность лечения определяются врачом.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. При длительном применении в высоких дозах возможна задержка выведения воды из организма.

Передозировка

Возможно нарушение функций печени.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Возможно усиление действия препаратов, стимулирующих функцию коры надпочечников.

Особые указания

Применение препарата не влияет на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Пациентам, находящимся на диете с ограничением поступления натрия необходимо учитывать, что в 1 таблетке препарата содержится 0,039 г натрия, в максимальной суточной дозе препарата (12 таблеток) – 0,47 г натрия.

При длительном применении в высоких дозах возможна задержка выведения воды из организма.

Форма выпуска

Таблетки, 50 мг. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку.

5 или 10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку с вкладышем из картона.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения/Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Адрес: 142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90.