МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

АУГМЕНТИН / AUGMENTIN

Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь,

200 мг + 28,5 мг в 5 мл, 400 мг + 57 мг в 5 мл

«Глаксо Вэллком Продакшен», Франция

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «___» 210521 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Торговое наименование: Аугментин® / Augmentin®.	**Торговое наименование:** Аугментин / Augmentin. * *Далее по тексту инструкции по медицинскому применению торговое наименование лекарственного препарата приведено в редакции: Аугментин.*
ФОРМА ВЫПУСКА Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 200 мг + 28,5 мг в 5 мл, 400 мг + 57 мг в 5 мл. Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь по 7,7 г (для дозировки 200 мг + 28,5 мг в 5 мл) или 12,6 г (для дозировки 400 мг + 57 мг в 5 мл) во флакон прозрачного стекла номинальным объемом 147 мл, закрытый навинчивающейся алюминиевой крышкой, покрытой с внутренней стороны лаком, с контролем	**ФОРМА ВЫПУСКА** Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 200 мг + 28,5 мг в 5 мл, 400 мг + 57 мг в 5 мл. По 7,7 г порошка для приготовления суспензии во флакон прозрачного стекла номинальным объемом 147 мл (для дозировки 200 мг + 28,5 мг в 5 мл). По 12,6 г порошка для приготовления суспензии во флакон прозрачного стекла номинальным объемом 147 мл или 25,2 г порошка во флакон прозрачного стекла

первого вскрытия и прокладкой из полимера (ПВХ или полиолефин). По 1 флакону вместе с инструкцией по применению и мерной ложкой или колпачком, или шприцем в пачку картонную с контролем первого вскрытия.	номинальным объемом 190 мл или 200 мл (для дозировки 400 мг + 57 мг в 5 мл). Флакон закрыт навинчивающейся алюминиевой крышкой, покрытой с внутренней стороны лаком, с контролем первого вскрытия и мембраной из полимера (ПВХ или полиолефин) или закрыт крышкой с внутренней и внешней оболочкой из полипропилена или полиэтилена высокой плотности с устройством против вскрытия флакона детьми и термозапечатываемой мембраной. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению и мерной ложкой или шприцем в пачку картонную с контролем первого вскрытия.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ Лекарственный препарат хранить в сухом месте при температуре не выше 25°С. Приготовленную суспензию хранить в холодильнике при температуре 2−8°С. Не замораживать приготовленную суспензию. Хранить в недоступном для детей месте.	**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ** В сухом месте при температуре не выше 30 °С. Приготовленную суспензию хранить в холодильнике при температуре 2−8 °С. Не замораживать приготовленную суспензию. Хранить в недоступном для детей месте.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ «СмитКляйн Бичем Лимитед» / «SmithKline Beecham Limited» BN14 8QH, Западный Суссекс, Ворсин, Клэрендон Роуд, Великобритания / Clarendon Road, Worthing, West Sussex, BN14 8QH, United Kingdom «Глаксо Вэллком Продакшен» / «Glaxo Wellcome Production»	**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** «Глаксо Вэллком Продакшен» / «Glaxo Wellcome Production» 53100, Терра II, ЗИ де ла Пейеньер, Майенн, Франция / Terras II, Z.I. de la Peyenniere, 53100, Mayenne, France.

53100, Терра II, ЗИ де ла Пейеньер, Майенн, Франция / Terras II, Z.I. de la Peyenniere, 53100, Mayenne, France	

Менеджер отдела
регуляторных отношений
АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»

Старкова Н.С.