

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА АРАЛИИ НАСТОЙКА

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Аралии настойка

Международное непатентованное или группировочное наименование: аралии маньчжурской корней настойка

Лекарственная форма: настойка.

Состав лекарственного препарата

Для получения настойки используют:

Активный компонент:

аралии маньчжурской корни – 200 г.

Вспомогательное вещество: этанол (спирт этиловый) 70 % – достаточное количество до получения 1000 мл настойки.

Описание: жидкость от желтого до коричневатого-желтого цвета с характерным запахом. В процессе хранения допускается выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа: общетонизирующие средства.

Код АТХ: A13A

Фармакологические свойства

Стимулирует центральную нервную систему, оказывает тонизирующее, гипертензивное, гипогликемическое действие.

Показания к применению

Препарат Аралии настойка показан к применению у взрослых и детей от 12 до 18 лет для лечения следующих состояний: артериальная гипотония, астенический синдром, физическое и психическое переутомление.

Противопоказания

Гиперчувствительность к активному компоненту или к любому из вспомогательных веществ, артериальная гипертензия, острый период течения инфекционно-воспалительных заболеваний, хронические заболевания печени, повышенная возбудимость, нарушение сна (бессонница), эпилепсия, гиперкинез, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

С осторожностью

Алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, детский возраст от 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь, до еды. Перед применением взбалтывать. Разовую дозу препарата предварительно следует развести в $\frac{1}{4}$ стакана воды.

Взрослым и детям старше 12 лет по 30–40 капель 2 раза в день (утром и в середине дня).

Курс лечения 15–30 дней. Повторный курс – по рекомендации врача.

Побочное действие

Нежелательные реакции (НР) распределены по системно-органным классам в соответствии со словарем MedDRA.

Нарушения со стороны иммунной системы: аллергические реакции.

Эндокринные нарушения: гипогликемия.

Нарушения со стороны нервной системы: нарушение сна (бессонница), эйфория, нервозность, головная боль.

Нарушения со стороны сердца: повышение артериального давления.

Нарушения со стороны сосудов: тахикардия.

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: диарея.

Если при применении препарата наблюдаются нежелательные реакции, или Вы заметили побочные эффекты, не указанные в данной инструкции, прекратите применение препарата и обратитесь к врачу.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, носовое кровотечение, гипогликемия.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Возможно потенцирование действия стимуляторов и аналептиков (кофеин, камфора, фенамин и др.); препарат является физиологическим антагонистом снотворного действия средств, угнетающих центральную нервную систему (в том числе барбитуратов, транквилизаторов, противосудорожных средств, седативных препаратов и т.д.).

Особые указания

Препарат следует принимать в первой половине дня, во избежание нарушения сна. Имеется четко выраженная сезонность действия: применение осенью и зимой наиболее эффективно.

Если слабость, усталость наблюдаются продолжительное время и вызваны неясными причинами, следует обратиться к врачу.

Вспомогательные вещества

Данный лекарственный препарат содержит 900 мг спирта этилового (этанола) в максимальной разовой дозе (40 капель), что эквивалентно 13 мг/кг. Количество спирта в максимальной разовой дозе данного лекарственного препарата эквивалентно менее чем 23 мл пива или 9 мл вина.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций. В период применения препарата следует воздержаться от управления транспортными средствами, занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Настойка.

По 25 мл во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками из полиэтилена высокого давления и крышками навинчиваемыми из полиэтилена высокого или низкого давления, или колпачками алюминиевыми с накатываемой резьбой и контролем первого вскрытия с уплотнительным элементом или без уплотнительного элемента.

По 25 мл во флаконы-капельницы оранжевого стекла, укупоренные пробками-капельницами из полиэтилена высокого или низкого давления и крышками навинчиваемыми из полиэтилена высокого или низкого давления.

Каждый флакон, флакон-капельницу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

**Держатель регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии
от потребителей**

АО «ДАЛЬХИМФАРМ», 680001, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Ташкентская, д. 22, т/ф (4212) 53-91-86, info@dhph.ru.

Производитель

АО «ДАЛЬХИМФАРМ», 680001, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Ташкентская, д. 22, стр. 3, стр. 8, т/ф (4212) 53-91-86, info@dhph.ru.