

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**ХОФИЦИН® ЭВАЛАР**

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** ХОФИЦИН® ЭВАЛАР

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** артишока посевного листьев экстракт

**Лекарственная форма:** таблетки, покрытые пленочной оболочкой

**Состав (на одну таблетку):**

**Активный компонент:** артишока посевного листьев экстракт сухой\*, с содержанием хлорогеновой кислоты в пересчете на сухое вещество не менее 0,5 % – 200,00 мг;

**Вспомогательные вещества:** целлюлоза микрокристаллическая, повидон К17, кроскармеллоза натрия, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат.

**Вспомогательные вещества оболочки:** гидроксипропилметилцеллюлоза (гипромеллоза), полиэтиленгликоль 4000, краситель железа оксид красный, титана диоксид, краситель железа оксид черный.

\* Артишока посевного листьев экстракт сухой получают из артишока листьев свежих – *Synara scolymus* L., сем. сложноцветных – Asteraceae; соотношение используемого сырья к полученному экстракту (15-35:1), экстрагент вода очищенная.

**Описание**

Таблетки круглые двояковыпуклые, покрытые оболочкой от красно-коричневого до коричневого цвета; на поперечном разрезе ядро от серовато-коричневого до коричневого цвета с более светлыми и более темными вкраплениями.

**Фармакотерапевтическая группа**

Средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей; средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей; другие средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей.

**Код АТХ:** A05AX

**Фармакологические свойства**

Фармакологический эффект препарата обусловлен комплексом входящих в состав листьев артишока посевного биологически активных веществ. Цинарин в сочетании с фенолокислотами обладает желчегонным, а также гепатопротективным действием. Аскорбиновая кислота, каротин, витамины В<sub>1</sub> и В<sub>2</sub>, инулин способствуют нормализации обменных процессов.

Препарат обладает также диуретическим действием и усиливает выведение мочевины.

### **Показания к применению**

Препарат применяется в комплексной терапии:

дискинезии желчевыводящих путей по гипокинетическому типу;

хронических некалькулезных холециститов;

хронических гепатитов;

цирроза печени;

хронического нефрита;

хронической почечной недостаточности.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, желчнокаменная болезнь, непроходимость (обтурация) желчевыводящих путей, острые заболевания печени, почек, желче- и мочевыводящих путей, тяжелая гепатоцеллюлярная недостаточность. Детский возраст до 6 лет.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно только по назначению и под контролем врача.

### **Способ применения и дозы**

Внутрь. Взрослым по 2-3 таблетки 3 раза в день до еды.

Детям старше 6 лет рекомендуется принимать по 1-2 таблетки (в зависимости от возраста) 3 раза в день до еды.

Курс лечения – 2-3 недели.

Проведение повторных курсов лечения возможно по согласованию с врачом.

### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции. При длительном применении препарата в высоких дозах возможно развитие диареи.

### **Передозировка**

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Взаимодействия с другими лекарственными средствами на данный момент неизвестны.

### **Особые указания**

При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 2-х недель, следует сообщить об этом лечащему врачу. В случае развития тяжелой длительной диареи или абдоминальной боли прием препарата должен быть прекращен и следует обратиться к врачу.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

### **Форма выпуска**

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг.

По 20 или 25 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки ПВХ/ПВДХ или пленки ПВХ/ПВДХ/ПВХ и гибкой упаковки, изготовленной на основе фольги алюминиевой.

По 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке (пачке).

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Владелец регистрационного удостоверения / Производитель / Организация, принимающая претензии от потребителей**

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ  
от 20.05.2024 № 9763  
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ЗАО «Эвалар», Россия, 659332, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 23/6,  
тел.: (3854) 39-00-50, 8-800-200-52-52, [www.evalar.ru](http://www.evalar.ru).