ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА

Регистрационный номер

Торговое название препарата: Аскорбиновая кислота

Международное непатентованное название: Аскорбиновая кислота.

Лекарственная форма:

Таблетки.

Состав препарата:

Активные компоненты:

аскорбиновой кислоты – 25 мг или 50 мг или 75 мг.

Вспомогательные вещества: декстроза (глюкоза), сахар, кислота стеариновая, крахмал картофельный, ароматизатор пищевой.

Описание: Таблетки белого цвета, плоскоцилиндрической формы с фаской.

Фармакотерапевтическая группа:

Витамин.

Код АТХ: [A11GA01].

Фармакологические свойства

Аскорбиновая кислота играет важную роль в регуляции окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, свертываемости крови, регенерации тканей, способствует повышению сопротивляемости организма. Аскорбиновая кислота (витамин С) не образуется в организме человека, а поступает только с пищей. При сбалансированном и полноценном питании человек не испытывает дефицит в витамине С.

Показания к применению

Профилактика и лечение гипо- и авитаминоза витамина С. При повышенной потребности организма в витамине С в период активного роста у детей, беременности, грудного вскармливания, при повышенных физических и умственных нагрузках, переутомлении, стрессовых состояниях, в период выздоровления после длительных и тяжелых заболеваний.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Не следует назначать большие дозы больным с повышенной свертываемостью крови, тромбофлебитами.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАРБИОФАРМ» г. ЙОШКАР-ОЛА РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА
марбиофарм
Копия верна
Секретарь

склонностью к тромбозам, а также при сахарном диабете и состояниях, сопровождающихся повышенным содержанием сахара в крови.

С осторожностью: дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, гемохроматоз, сидеробластная анемия, талассемия, гипероксалурия, оксалоз, почечнокаменная болезнь.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь, после еды.

С профилактической целью назначают:

Взрослым- по 50-100 мг/сут.; детям 25 мг/сут. В период беременности и лактации по 300мг/сут. в течение 10-15 дней, затем по 100мг/сут.

С лечебной целью назначают:

Взрослым - по 50-100 мг/сут 3-5 раз в день; детям по 50-100 мг 2-3 раза в день.

Длительность лечения зависит от характера и течения заболевания и определяется врачом.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции к компонентам препарата.

Со стороны пищеварительной системы: при приеме внутрь – раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Изменение лабораторных показателей: тромбоцитоз, гиперпротромбинемия, эритропения, нейтрофильный лейкоцитоз, гипокалиемия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Аскорбиновая кислота повышает всасывание препаратов группы пенициллина, железа.

Особые указания

В связи со стимулирующим действием аскорбиновой кислоты на образование глюкокортикостероидных гормонов необходимо следить за функцией надпочечников и артериальным давлением. При длительном применении больших доз возможно угнетение функции инсулярного аппарата поджелудочной железы, поэтому в процессе лечения необходимо регулярно контролировать функциональную способность поджелудочной железы.

Форма выпуска

Таблетки 25, 50, 75 мг.

По 10таблеток упаковывают в бумагу парафинированную и наклеивают этикетку. Полный текст инструкции по применению наносится на лицевую и оборотную стороны этикетки.

Срок годности

2 года. Не использовать препарат по истечении срока годности.

Копия верна
Секретарь

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°.

Хранить в недоступном для детей месте

Отпуск из аптек

Без рецепта.

Производитель и адрес предприятия для принятия претензий

ОАО «Марбиофарм», 424006, Россия,

Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. К.Маркса, 121.

Тел./факс: (8362) 45-00-00

И.о. директора ИДКЭЛС А.Н.Васильев

Генеральный директор

ОАО «Марбиофарм» В.И.Туманов

Копия верна

Секретарь