Инструкция

по медицинскому применению препатрата

Вагинорм-С®

Vaginorm-C

Регистрационный номер:

Торговое название: Вагинорм-С®

Международное непатентованное название: аскорбиновая кислота

Лекарственная форма: таблетки вагинальные

Состав в 1 вагинальной таблетке:

Активное вещество: аскорбиновая кислота 250 мг

Вспомогательные вещества: полиметилсилоксан 10 мг, лактозы моногидрат 670 мг, гипромеллоза 60 мг, магния стеарат 10 мг.

Описание

Овальные таблетки от белого до белого со светло-желтым оттенком цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептическое

Код АТХ : G01AD03

Фармакологическое действие

Аскорбиновая кислота снижает pH влагалища, ингибируя рост бактерий и способствует восстановлению и поддержанию нормальных показателей pH и флоры влагалища (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus gasseri).

Таким образом, при снижении pH влагалища в течение нескольких дней происходит выраженное подавление роста анаэробных бактерий, а также восстановление нормальной флоры (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus gasseri).

26.03.08

Фармакокинетика

В системном кровотоке обнаруживается в незначительном количестве, выводится через почки

Показания

- Хронический или рецидивирующий вагинит (бактериальный вагиноз, неспецифический вагинит), обусловленный анаэробной флорой (вследствии измененного pH влагалища).

- Для нормализации нарушенной микрофлоры влагалища.

Противопоказания

- Гиперчувствительности к любому из компонентов;

- Кандидозный вульвовагинит.

Применение при беременности и лактации

Не противопоказан во время беременности и лактации.

Способ применения и дозы

Интравагинально. 1 вагинальную таблетку вводят во влагалище лежа на спине при слегка согнутых ногах 1 раз вечером перед сном. Курс лечения составляет 6 дней. Возможны повторные курсы лечения.

При необходимости курс терапии возможно продлить на более длительный срок.

Побочное действие

Препарат хорошо переносится.

Очень редко (<1/10000)- гиперчувствительность к одному из компонентов препарата

Редко (< 1/100, ≥ 1/1000 случаев) возможно жжение или зуд во влагалище, усиление слизистых выделений, гиперемия, отечность вульвы.

Передозировка

Случаи передозировки не описаны.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Салицилаты стимулируют процесс выведения витамина С из организма. Эстрогены улучшают биодоступность витамина С. Витамин С снижает активность антикоагулянтов.

Особые указания

Препарат не угнетает рост грибковой флоры влагалища.

Перерывы в применении Вагинорма С в связи с межциклическими или менструальными кровотечениями не обязательны.

Витамин С изменяет картину содержания глюкозы в моче, так же как и картину содержания трансаминаз, лактата дегидрогеназы и билирубина в сыворотке крови.

Такие проявления, как жжение и зуд могут быть обусловлены наличием сопутствующей асимптоматической грибковой инфекцией. Поэтому при появлении данных симптомов следует провести анализ для исключения грибковой инфекции.

Форма выпуска

Вагинальные таблетки 250 мг. По 6 вагинальных таблеток в блистер из ПВХ-ПВДХ/ Ал. По 1 блистеру вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Срок годности

3 года.

Не использовать по истечении срока годности указанного на упаковке.

Условия хранения

В сухом месте при температуре не выше 25 °С.

В недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптеки

Без рецепта.

Адрес производителя

Полихем С.А., (Люксембург),

произведено Артезан Фарма ГмбХ и Ко.КГ,

Вендландштрассе 1 29439 Люхов, Германия.

Претензии по качеству отправлять по адресу:

ООО Солвей Фарма

Россия 119334

Москва, Вавилова, 24

тел: +7(495) 411-69-11

факс: +7(495) 411-69-10

Internet: www.solvay-pharma.ru

И.о. директора ИДК ЛС А.Н. Васильев

Генеральный директор
ООО «Солвей Фарма» Л.Н. Паршенков