ЛП-№(010742)-(РГ-RU) от 30.06.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.06.2025 № 15833
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Мальвы и подорожника сироп с витамином С

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Мальвы и подорожника сироп с витамином С

Международное непатентованное или группировочное наименование: Аскорбиновая кислота + (Мальвы лесной цветков + Подорожника ланцетовидного листьев) экстракт

Лекарственная форма: сироп

Состав на 100 мл препарата

Активные компоненты

[Подорожника ланцетовидного листьев и мальвы лесной цветков] экстракт ([Подорожника ланцетовидного листьев и мальвы лесной цветков] экстракт жидкий)	–	50,0 г
Аскорбиновая кислота	–	1,3 г

Вспомогательные вещества

Сахароза	–	81,60 г
Метилпарагидроксибензоат (Е 218)	–	0,160 г
Ароматизатор апельсиновый	–	0,240 г

*Фармацевтическую субстанцию подорожника ланцетовидного листьев и мальвы лесной цветков экстракт получают из смеси двух видов лекарственного растительного сырья: из цельных или фрагментированных листьев и черешков многолетнего травянистого растения подорожника ланцетовидного – *Plantago lanceolata* L., семейство подорожниковые – *Plantaginaceae* и цветков одно-двулетнего травянистого растения мальвы лесной – *Malva sylvestris* L., семейство мальвовые – *Malvaceae*, путем экстрагирования водой очищенной при соотношении сырья и конечного продукта 1 : 5.

Описание

Густоватая жидкость от коричневого до красновато-коричневого цвета с характерным запахом. Допускается наличие опалесценции.

Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающие препараты в комбинации.

Код АТХ

R05CA10.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.06.2025 № 15833
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Обладает отхаркивающим, противовоспалительным, противомикробным (бактериостатическим) действием.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению

Препарат применяется в комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, сопровождающихся сухим кашлем; а также при сухом кашле курильщиков.

Противопоказания

Гиперчувствительность к активным компонентам и/или любому вспомогательному веществу в составе препарата; гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка с повышенной кислотностью; дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; беременность, период грудного вскармливания; детский возраст до 2 лет.

С осторожностью

Пациентам с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов. Детский возраст до 4-х лет.

Если у Вас есть одно из перечисленных выше заболеваний/состояний или факторов риска, перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Внутрь, запивая достаточным количеством чая или теплой воды.

Детям от 2 до 7 лет – по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза в день.

Детям от 7 до 14 лет – по 1-2 чайной ложки (5-10 мл) 3 раза в день.

Взрослым и детям старше 14 лет – по 2 чайные ложки (10 мл) 3-5 раз в день.

Курс лечения – 2-3 недели.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.06.2025 № 15833
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Пациент не должен пить что-либо или принимать пищу сразу после приема препарата, так как это может ускорить удаление лекарственного препарата со слизистых оболочек полости рта и горла.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции; диспепсические явления (изжога).

Если у Вас отмечаются нежелательные реакции, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени сведений о случаях передозировки не зарегистрировано.

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые в инструкции, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не следует применять одновременно с противокашлевыми препаратами и лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Препарат не следует применять одновременно с другими лекарственными препаратами, содержащими аскорбиновую кислоту.

Особые указания

Препарат не рекомендуется для применения у детей в возрасте до 4-х лет без предварительной консультации врача. При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 14 дней следует обратиться к врачу. При возникновении одышки, лихорадки или мокроты с кровью следует обратиться к врачу. В период лечения препаратом рекомендуется употреблять достаточное количество жидкости в теплом виде (вода, чай и др.).

Препарат содержит сахарозу.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.06.2025 № 15833
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что в одной чайной ложке (5 мл) содержится около 4,0 г углеводов (0,34 ХЕ).

Пациентам с редкой врожденной непереносимостью фруктозы или глюкозо-галактозной мальабсорбцией, или сахаразной-изомальтазной недостаточностью не следует принимать этот препарат.

В состав препарата входит метилпарагидроксибензоат, в связи с чем могут наблюдаться аллергические реакции (возможно, отсроченные).

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Сироп.

По 100 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробками из полиэтилена высокого давления и крышками навинчиваемыми белого цвета из полиэтилена высокого или низкого давления.

По 100 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные колпачками алюминиевыми с перфорацией с прокладками из вспененного полиэтилена.

По 100 мл во флаконы из полиэтилентерефталата коричневого цвета с колпачками из полиэтилена низкого давления с контролем первого вскрытия.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Не хранить в холодильнике.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. После вскрытия флакона – 3 мес.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.06.2025 № 15833
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Производитель/Держатель регистрационного удостоверения/ Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-90, 716-15-81.