ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ
ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА
ГЕРБИОН® СИРОП ПОДОРОЖНИКА
HERBION® PLANTAIN SYRUP

Регистрационный номер:
Торговое (патентованное) название: Гербион® сироп подорожника
Лекарственная форма: сироп

Состав
На 5 мл (6,6 г):
Активные компоненты:

Подорожника ланцетовидного листьев экстракт жидкий (1:5)* (Plantaginis lanceolantae herbae Extractum aquosum, семейство подорожниковые - Plantaginaceae (1:5), экстрагент – вода)	1,25 г
Мальвы цветков экстракт жидкий (1:5)** (Malvae sylvestris flos extractum aquosum, семейство – мальвовые - Malvaceae (1:5), экстрагент – вода)	1,25 г
Аскорбиновая кислота	65 мг

Вспомогательные вещества: сахароза, метилпарагидросибензоат, (Е218), апельсина масло.
* Водный экстракт подорожника ланцетовидного (1:5) приготовлен:
- подорожника ланцетовидного листьев
- вода очищенная
** Водный экстракт мальвы цветков (1:5) приготовлен:
- мальвы цветки
- вода очищенная
Соотношение 1:5 соответствует отношению лекарственной травы: экстракта: из 1 части лекарственных трав получают 5 частей экстракта.

Описание
Сироп от коричневого до красновато-коричневого цвета с характерным запахом. Допускается незначительная опалесценция.

Фармакотерапевтическая группа: отхаркивающее средство растительного происхождения
Код АТХ: R05CA10

Фармакологические свойства
Препарат обладает отхаркивающим, противовоспалительным, противомикробным (бактериостатическим) действием.

Показания к применению
Препарат применяется в комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, сопровождающихся сухим кашлем; а также при сухом кашле курильщиков.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, сахарный диабет, врожденная непереносимость фруктозы, синдром нарушенного всасывания глюкозы-галактозы, врожденной недостаточности сахаразы-изомальтазы, детский возраст до 2 лет.

Применение в беременность и период лактации
Беременным и кормящим женщинам принимать препарат не рекомендуется (в связи с недостаточностью данных по безопасности применения препарата у указанной группы пациентов).

Способ применения и дозы
Внутрь, препарат рекомендуется принимать, запивая достаточным количеством чая или теплой воды.
Взрослым и детям старше 14 лет препарат назначается по 2 мерных ложки (10 мл) 3-5 раз в сутки.
Детям в возрасте от 7 до 14 лет - по 1-2 мерной ложки (5 -10 мл) 3 раза в сутки.
Детям в возрасте от 2 до 7 лет - по 1 мерной ложке (5 мл) 3 раза в сутки.
Длительность курса терапии 2-3 недели. Увеличение длительности или назначение повторного курса терапии возможно после консультации с врачом.

Побочное действие
Возможны аллергические реакции. В случае появления побочных эффектов следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Передозировка
До настоящего времени сведений о случаях передозировки не поступало.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Гербион® сироп подорожника не следует применять одновременно с противокашлевыми препаратами и лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания
В 1 мерной ложке сиропа (5 мл) содержится 4 г сахарозы. При соблюдении рекомендаций по применению препарата, указанных в инструкции, пациент получает на прием от 4 г (1 мерная ложка) (соответствует 0,4 хлебным единицам) до 8 г (2 мерных ложки) (соответствует 0,8 хлебным единицам) сахарозы.
Гербион® сироп подорожника не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Форма выпуска
Сироп. По 150 мл сиропа во флаконе темного стекла (тип III), закупоренного пластмассовой пробкой с рассекателем жидкости и пластиковой крышкой с контролем первого вскрытия.
Каждый флакон помещают в пачку картонную вместе с дозирующей пластиковой ложкой и инструкцией по применению.

Условия хранения
Хранить при температуре от 15 °С до 30 °С.
Не хранить в холодильнике.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
2 года.
Не использовать препарат после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

Производитель: КРКА, д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения

По всем вопросам обращаться по адресу Представительства в РФ:
123022, Москва, ул.2-я Звенигородская, д.13 , стр.41
Тел. (495) 739-66-00, факс: (495) 739-66-01

И.о. директора ИДКЭЛС А.Н. Васильев

Представитель фирмы О.А. Грибульская