МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-007886-150222
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Мальвы и подорожника сироп с витамином С

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Мальвы и подорожника сироп с витамином С

Международное непатентованное или группировочное наименование: Аскорбиновая кислота + (Мальвы цветков + Подорожника ланцетовидного листьев) экстракт

Лекарственная форма: сироп

Состав на 100 мл препарата

Активные компоненты

Подорожника ланцетовидного листьев и мальвы лесной цветков экстракт (Подорожника ланцетовидного листьев и мальвы лесной цветков экстракт жидкий)	–	50,0 г
Аскорбиновая кислота	–	1,3 г

Вспомогательные вещества

Сахароза	–	81,60 г
Метилпарагидроксибензоат (Е 218)	–	0,160 г
Ароматизатор апельсиновый	–	0,240 г

*Фармацевтическую субстанцию подорожника ланцетовидного листьев и мальвы лесной цветков экстракт получают из смеси двух видов лекарственного растительного сырья: из цельных или фрагментированных листьев и черешков многолетнего травянистого растения подорожника ланцетовидного – *Plantago lanceolata* L., семейство подорожниковые – *Plantaginaceae* и цветков одно-двулетнего травянистого растения мальвы лесной – *Malva sylvestris* L., семейство мальвовые – *Malvaceae*, путем экстрагирования водой очищенной при соотношении сырья и конечного продукта 1 : 5.

Описание

Густоватая жидкость от коричневого до красновато-коричневого цвета с характерным запахом. Допускается наличие опалесценции.

Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающее средство растительного происхождения.

Код АТХ

R05CA10.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Обладает отхаркивающим, противовоспалительным, противомикробным (бактериостатическим) действием.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению

Препарат применяется в комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, сопровождающихся сухим кашлем; а также при сухом кашле курильщиков.

Противопоказания

Гиперчувствительность к активным компонентам и/или любому вспомогательному веществу в составе препарата; гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка с повышенной кислотностью; дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; беременность, период грудного вскармливания; детский возраст до 2 лет.

С осторожностью

Пациентам с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов.

Если у Вас есть одно из перечисленных выше заболеваний/состояний или факторов риска, перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Внутрь, запивая достаточным количеством чая или теплой воды.

Детям от 2 до 7 лет – по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза в день.

Детям от 7 до 14 лет – по 1-2 чайной ложки (5-10 мл) 3 раза в день.

Взрослым и детям старше 14 лет – по 2 чайные ложки (10 мл) 3-5 раз в день.

Курс лечения – 2-3 недели.

Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции; диспепсические явления (изжога).

Если у Вас отмечаются нежелательные реакции, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени сведений о случаях передозировки не зарегистрировано.

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые в инструкции, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не следует применять одновременно с противокашлевыми препаратами и лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Препарат не следует применять одновременно с другими лекарственными препаратами, содержащими аскорбиновую кислоту.

Особые указания

Препарат содержит сахарозу. Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что в одной чайной ложке (5 мл) содержится около 4,0 г углеводов (0,34 ХЕ).

При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 14 дней следует сообщить об этом лечащему врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Сироп.

По 100 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробками из полиэтилена высокого давления и крышками навинчиваемыми белого цвета из полиэтилена высокого или низкого давления.

По 100 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные колпачками алюминиевыми с перфорацией с прокладками полимерными.

По 100 мл во флаконы из полиэтилентерефталата коричневого цвета с колпачками из полиэтилена низкого давления с контролем первого вскрытия.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Не хранить в холодильнике.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. После вскрытия флакона – 3 мес.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Московская обл., Серпуховский муниципальный район, городское поселение Оболенск, район рабочего поселка Оболенск, шоссе Оболенское, стр. 20.

Владелец регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии потребителя

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

142279, Московская обл., Серпуховский район, рабочий пос. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел./факс: (495) 716-15-81, 716-15-90.

Генеральный директор
ЗАО «ВИФИТЕХ» _____ С.А. Постельников
подпись ФИО