ИНСТРУКЦИЯ

(информация для потребителей)

по медицинскому применению препарата

АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА С ГЛЮКОЗОЙ

Регистрационный номер

Торговое название препарата: Аскорбиновая кислота с глюкозой

Лекарственная форма:

Таблетки.

Состав препарата:

Активные компоненты:

аскорбиновой кислоты – 100 мг, глюкозы – 877 мг.

Вспомогательные вещества: тальк, кислота стеариновая, сахароза, стеарат кальция.

Описание: Таблетки белого цвета, плоскоцилиндрической формы с фаской и риской.

Фармакотерапевтическая группа:

Средство, регулирующее метаболические процессы, витаминный препарат.

Код АТХ: [A11GB].

Фармакологические свойства

Аскорбиновая кислота играет важную роль в регуляции окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, свертываемости крови, регенерации тканей, способствует повышению сопротивляемости организма. Аскорбиновая кислота (витамин С) не образуется в организме человека, а поступает только с пищей. При сбалансированном и полноценном питании человек не испытывает дефицит в витамине С.

Показания к применению

Профилактика и лечение гипо- и авитаминоза витамина С. При повышенной потребности организма в витамине С в период активного роста у детей, беременности, грудного вскармливания, при высоких физических и умственных нагрузках, переутомлении, стрессовых состояниях, в период выздоровления после длительных и тяжелых заболеваний.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Не следует назначать большие дозы больным с повышенной свертываемостью крови, тромбофлебитами и склонностью к тромбозам, а также при сахарном диабете и состояниях, сопровождающихся повышенным содержанием сахара в крови.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь, после еды.

С профилактической целью назначают:

Взрослым- по 50-100мг/сут.; детям 25мг/сут. В период беременности и лактации по 300мг/сут. в течение 10-15 дней, затем по 100мг/сут.

С лечебной целью назначают:

Взрослым- по 50-100мг/сут 3-5 раз в день; детям по 50-100 мг 2-3 раза в день.

Сроки лечения зависят от характера и течения заболевания и рекомендуются врачом.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции к компонентам препарата.

Передозировка

При приеме более 1 г в день возможны изжога, диарея, затрудненное мочеиспускание, окрашивание мочи в красный цвет, гемолиз (у пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Аскорбиновая кислота повышает всасывание препаратов группы пенициллина, железа.

Особые указания

В связи со стимулирующим действием аскорбиновой кислоты на образование кортикостероидных гормонов необходимо следить за функцией почек и артериальным давлением. При длительном применении больших доз возможно угнетение функции инсулярного аппарата поджелудочной железы, поэтому в процессе лечения необходимо регулярно контролировать функциональную способность поджелудочной железы. Лицам с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы следует применять препарат с осторожностью.

Форма выпуска

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку. По 40 таблеток в банку из стекломассы. 3 контурные ячейковые упаковки или банку вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Срок годности

2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°.

Хранить в недоступном для детей месте

Отпуск из аптек

Без рецепта.

Производитель
ОАО «Марбиофарм»
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар – Ола, ул. К. Маркса, 121
Тел./факс (8362) 45 00 00

Генеральный директор В.И. Туманов

Директор ИДКЭЛС В.В. Чельцов