МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-001692-081020
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Трактоцил
(торговое наименование лекарственного препарата)

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 7,5 мг/мл
(лекарственная форма, дозировка)

Ферринг ГмбХ, Германия
ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», Россия
(наименование производителя, страна)

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» 081020 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Концентрат для приготовления раствора для инфузий 7,5 мг/мл. По 5 мл препарата в бесцветном флаконе вместимостью 5 мл из стекла типа I, укупоренный бромобутиловой пробкой серого цвета и герметично закрытый крышкой типа «флип-офф». 1 флакон в пластиковой ячейковой упаковке помещают в картонную пачку вместе с инструкцией по применению. На картонную пачку возможно нанесение стикера(ов) для контроля первого вскрытия.	**Форма выпуска** Концентрат для приготовления раствора для инфузий 7,5 мг/мл. По 5 мл препарата во флакон из бесцветного стекла типа I, укупоренный бромобутиловой пробкой и герметично закрытый крышкой типа «флип-офф». 1 флакон в пластиковой ячейковой упаковке помещают в пачку картонную вместе с инструкцией по применению. На пачку картонную возможно нанесение стикера(ов) для контроля первого вскрытия.

Директор по регуляторным вопросам
ООО «Ферринг Фармасетикалз» Д.Д. Эксузян

ФГБУ МЗ РФ ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 ЦМЭСМП

"Ферринг Фармасетикалз"

129850

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-001692-081020
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Трактоцил
(торговое наименование лекарственного препарата)

раствор для внутривенного введения, 7,5 мг/мл
(лекарственная форма, дозировка)

Ферринг ГмбХ, Германия
ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», Россия
(наименование производителя, страна)

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» _____ 20___ г. 081020

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Раствор для внутривенного введения 7,5 мг/мл. По 0,9 мл препарата в бесцветном флаконе вместимостью 2 мл из стекла типа I, укупоренный бромобутиловой пробкой серого цвета и герметично закрытый крышкой типа «флип-офф». 1 флакон в пластиковой ячейковой упаковке помещают в картонную пачку вместе с инструкцией по применению. На картонную пачку возможно нанесение стикера(ов) для контроля первого вскрытия.	**Форма выпуска** Раствор для внутривенного введения 7,5 мг/мл. По 0,9 мл препарата во флакон из бесцветного стекла типа I, укупоренный бромобутиловой пробкой и герметично закрытый крышкой типа «флип-офф». 1 флакон в пластиковой ячейковой упаковке помещают в пачку картонную вместе с инструкцией по применению. На пачку картонную возможно нанесение стикера(ов) для контроля первого вскрытия.

Директор по регуляторным вопросам
ООО «Ферринг Фармасетикалз» Д.Д. Эксузян

ФГБУ НЦЭСМП
МЗ РФ
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ферринг Фармасетикалз" МОСКВА 1097746012137

129850