ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата ОСАРБОН®

Регистрационный номер

Торговое название препарата Осарбон®

Международное непатентованное название Ацетарсол

Лекарственная форма Суппозитории вагинальные

Описание

Суппозитории белого или белого с желтоватым или кремоватым оттенком цвета, торпедообразной формы.

Состав

В одном суппозитории содержится – активные вещества: ацетарсола (осарсола) – 0,25 г и вспомогательные вещества: кислоты борной – 0,3 г, глюкозы (декстрозы) – 0,3 г, витепсол - достаточное количество для получения суппозитория массой 2,8 г.

Фармакотерапевтическая группа

Противопротозойное средство

Код АТХ: G01AB01.

Фармакологические свойства

Ацетарсол, благодаря способности блокировать сульфгидрильные ферментные системы, нарушает обменные процессы простейших (в том числе трихомонад, амеб), некоторых спирохет. Для предупреждения резорбции препарата (и возможной интоксикации) необходимо поддержание кислой среды влагалища. Глюкоза (декстроза), входящая в состав препарата, является питательным субстратом для лактобацилл нормальной вагинальной микрофлоры. Лактобациллы разлагают глюкозу с образованием молочной кислоты, обеспечивая кислую среду влагалища. Борная кислота также поддерживает кислую среду влагалища.

Показания к применению

Трихомонадный кольпит.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, печеночная и/или почечная недостаточность, сахарный диабет, геморрагический диатез, туберкулез, беременность.

Способ применения и дозы

Предварительно освободив суппозиторий от контурной ячейковой упаковки, его вводят, лежа на спине, глубоко во влагалище. Применяют по 1 суппозиторию 1 раз в сутки в течение 10 дней.

Побочное действие

Аллергические реакции, гепатит, полиневрит.

Передозировка

При применении препарата Осарбон® интравагинально случаев передозировки не отмечалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Лекарственное взаимодействие препарата до настоящего времени не описано.

Особые указания

Применение препарата не влияет на управление транспортными средствами и работу с машинами и оборудованием.

Форма выпуска

Суппозитории вагинальные, по 5 штук в контурной ячейковой упаковке. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки с инструкцией по медицинскому применению препарата в картонной пачке.

Условия хранения

Список А. В защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности

3 года. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Изготовитель

ОАО «НИЖФАРМ», Россия

603950, Нижний Новгород
ГСП-459, ул. Салганская, 7
факс (8312) 30-72-28
тел (8312) 78-80-88
интернет: www.nizhpharm.ru

Директор ИДКЭЛС, профессор В.В.Чельцов

Начальник медицинского отдела ОАО «Нижфарм» Р.В.Иванов