

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Аспикард

(торговое наименование лекарственного препарата)

таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг и 150 мг

(лекарственная форма, дозировка)

**Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов»
(ОАО «БЗМП»), Республика Беларусь**

(наименование производителя, страна)

Изменение №2

Дата внесения Изменения «___» _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: одна таблетка содержит: <i>действующее вещество:</i> ацетилсалициловая кислота – 75,00 мг или 150,00 мг; <i>вспомогательные вещества:</i> крахмал 1500 (крахмал кукурузный частично прежелатинизированный); целлюлоза микрокристаллическая; стеариновая кислота; <i>состав оболочки:</i> опадрай* бесцветный; акрил-из** розовый. <i>*Состав опадрай бесцветный:</i> гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза с вязкозстью 6); триацетин; тальк. <i>**Состав акрил-из розовый:</i> метакриловой кислоты и этилакрилата сополимер (1:1); тальк; триэтилцитрат; кремния диоксид коллоидный безводный; натрия карбонат; натрия лаурилсульфат; окрашивающий пигмент: титана диоксид Е 171; железа оксид желтый Е 172; железа оксид красный (в виде премикса с тальком (1:3)), Е 172.	Состав: одна таблетка содержит: <i>действующее вещество:</i> ацетилсалициловая кислота – 75,00 мг или 150,00 мг; <i>вспомогательные вещества:</i> крахмал кукурузный частично прежелатинизированный; целлюлоза микрокристаллическая; стеариновая кислота; <i>пленкообразователь</i> (бесцветный)**; пленкообразователь (розовый)***. <i>**Состав пленкообразователя (бесцветный):</i> гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза с вязкозстью 6); триацетин; тальк. <i>***Состав пленкообразователя (розовый):</i> метакриловой кислоты и этилакрилата сополимер (1:1); тальк; триэтилцитрат; кремния диоксид коллоидный безводный; натрия карбонат; натрия лаурилсульфат; окрашивающий пигмент: титана диоксид Е 171; железа оксид желтый Е 172; железа оксид красный (в виде премикса с тальком (1:3)), Е 172.

Срок годности 2 года. Не применять после истечения срока годности.	Срок годности 3 года. Не применять после истечения срока годности.
Производитель Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева 64а, e-mail: market@borimed.com, http://www.borimed.com .	Производитель Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева 64А, e-mail: market@borimed.com, http://www.borimed.com .

Генеральный директор
открытого акционерного общества
«Борисовский завод медицинских препаратов»

И.А. Митрофанов

