МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-006548/09- 301115
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Тромбопол®

Ацетилсалициловая кислота

Таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, 75 мг, 150 мг

Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО, Польша

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» 301115 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Лекарственная форма: таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой	**Лекарственная форма:** таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой
Состав: 1 таблетка, покрытая кишечнорастворимой оболочкой содержит: *Активное вещество:* ацетилсалициловая кислота 75 мг или 150 мг. *Вспомогательные вещества:* крахмал кукурузный, целлюлоза микрокристаллическая, карбоксиметилкрахмал натрия. *Оболочка:* гипромеллоза, Акрил-Айз (смесь для покрытия таблеток): метакриловой кислоты сополимер тип С, тальк, титана диоксид, триэтилцитрат, краситель пунцовый [Понсо 4R], кремния	**Состав** 1 таблетка (75 мг) содержит: *Активное вещество:* ацетилсалициловая кислота 75,00 мг. *Вспомогательные вещества:* целлюлоза 14,50 мг, крахмал кукурузный 9,50 мг, карбоксиметилкрахмал натрия (тип С) 1,00 мг. *Оболочка:* гипромеллоза 2,00 мг, триэтилцитрат 0,80 мг, *Акрил-из белый (кишечнорастворимое покрытие):* метакриловой кислоты и этилакрилата сополимер [1:1] 4,75 мг, тальк 1,19 мг, титана диоксид 1,08 мг, натрия

диоксид коллоидный, натрия гидрокарбонат, натрия лаурилсульфат.	лаурилсульфат 0,04 мг, кремния диоксид коллоидный 0,07 мг, натрия гидрокарбонат 0,07 мг. 1 таблетка (150 мг) содержит: *Активное вещество:* ацетилсалициловая кислота 150,00 мг. *Вспомогательные вещества:* целлюлоза 29,00 мг, крахмал кукурузный 19,00 мг, карбоксиметилкрахмал натрия (тип С) 2,00 мг. *Оболочка:* гипромеллоза 4,00 мг, триэтилцитрат 1,60 мг, *Акрил-из белый (кишечнорастворимое покрытие):* метакриловой кислоты и этилакрилата сополимер [1:1] 9,50 мг, тальк 2,38 мг, титана диоксид 2,16 мг, натрия лаурилсульфат 0,08 мг, кремния диоксид коллоидный 0,14 мг, натрия гидрокарбонат 0,14 мг.
Описание: Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, розового цвета, круглые, двояковыпуклые.	**Описание** Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой белого цвета, круглые, двояковыпуклые.
Форма выпуска Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 75 мг или 150 мг. **Таблетки 75 мг:** по 10 или 25 таблеток в блистеры из ПВХ/AL-фольги. По 2 блистера (25 таблеток) или 3, 5, 6 блистеров (по 10 таблеток) с инструкцией по медицинскому применению в картонную пачку.	**Форма выпуска** Таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, 75 мг или 150 мг. По 10 таблеток в блистер из фольги Ал/ПВХ/ПВДХ. По 3, 5 или 6 блистеров вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Таблетки 150 мг: по 10 таблеток в блистер из ПВХ/AL-фольги. По 3, 5 или 6 блистеров с инструкцией по медицинскому применению в картонную пачку. **Срок годности** 2 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.	 **Срок годности** 2 года. Не применять препарат после истечения срока годности.

Руководитель отдела регистрации Скрынникова Е.В.