МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-006548/09-250919
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Тромбопол®
таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, 75 мг, 150 мг

Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО, Польша

Изменение № 4

Дата внесения Изменения «____» 250919 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав 1 таблетка (75 мг) содержит: *Активное вещество:* ацетилсалициловая кислота 75,00 мг. *Вспомогательные вещества:* целлюлоза 14,50 мг, крахмал кукурузный 9,50 мг, карбоксиметилкрахмал натрия (тип С) 1,00 мг. *Оболочка:* гипромеллоза 2,00 мг, триэтилцитрат 0,80 мг, *Акрил-из белый (кишечнорастворимое покрытие):* метакриловой кислоты и этилакрилата сополимер [1:1] 4,75 мг, тальк 1,19 мг, титана диоксид 1,08 мг, натрия лаурилсульфат 0,04 мг, кремния диоксид коллоидный 0,07 мг, натрия гидрокарбонат 0,07 мг. 1 таблетка (150 мг) содержит:	**Состав** 1 таблетка (75 мг) содержит: *Активное вещество:* ацетилсалициловая кислота 75,00 мг. *Вспомогательные вещества:* целлюлозы порошок, крахмал кукурузный, карбоксиметилкрахмал натрия (тип С). *Оболочка:* гипромеллоза, триэтилцитрат, *Акрил-из белый (кишечнорастворимое покрытие):* метакриловой кислоты и этилакрилата сополимер [1:1], тальк, титана диоксид, натрия лаурилсульфат, кремния диоксид коллоидный, натрия гидрокарбонат. 1 таблетка (150 мг) содержит: *Активное вещество:* ацетилсалициловая кислота 150,00 мг. *Вспомогательные вещества:*

Активное вещество: ацетилсалициловая кислота 150,00 мг. *Вспомогательные вещества:* целлюлоза 29,00 мг, крахмал кукурузный 19,00 мг, карбоксиметилкрахмал натрия (тип С) 2,00 мг. *Оболочка:* гипромеллоза 4,00 мг, триэтилцитрат 1,60 мг, *Акрил-из белый (кишечнорастворимое покрытие):* метакриловой кислоты и этилакрилата сополимер [1:1] 9,50 мг, тальк 2,38 мг, титана диоксид 2,16 мг, натрия лаурилсульфат 0,08 мг, кремния диоксид коллоидный 0,14 мг, натрия гидрокарбонат 0,14 мг.	целлюлозы порошок, крахмал кукурузный, карбоксиметилкрахмал натрия (тип С). *Оболочка:* гипромеллоза, триэтилцитрат, *Акрил-из белый (кишечнорастворимое покрытие):* метакриловой кислоты и этилакрилата сополимер [1:1], тальк, титана диоксид, натрия лаурилсульфат, кремния диоксид коллоидный, натрия гидрокарбонат.
Срок годности 2 года. Не применять препарат после истечения срока годности.	**Срок годности** 3 года. Не применять препарат после истечения срока годности.

Представитель компании

Акционерное общество * Старая Купавна Московская область *

В.В. Вербилович