МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

КАРДИОМАГНИЛ
(наименование лекарственного препарата)

таблетки покрытые пленочной оболочкой, 75 мг + 15,2 мг и 150 мг + 30,39 мг
(лекарственная форма, дозировка)

Такеда ГмбХ, Германия
Такеда Фарма А/С, Дания
ООО «Такеда Фармасьютикалс», Россия
(наименование производителя, страна)

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-003875/07-310720
СОГЛАСОВАНО

Изменение № 7

Дата внесения Изменения «____» _____ 20___ г.
310720

Старая редакция	Новая редакция
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами (см. также раздел «Особые указания») При одновременном применении АСК усиливает действие следующих лекарственных препаратов: • метотрексата за счет снижения почечного клиренса и вытеснения его из связи с белками • гепарина и непрямых антикоагулянтов за счет нарушения функции тромбоцитов и вытеснения непрямых антикоагулянтов из связи с белками • тромболитических и антиагрегантных и антикоагулянтных препаратов	**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами (см. также раздел «Особые указания»)** При одновременном применении АСК усиливает действие следующих лекарственных препаратов: • метотрексата за счет снижения почечного клиренса и вытеснения его из связи с белками • гепарина и непрямых антикоагулянтов за счет нарушения функции тромбоцитов и вытеснения непрямых антикоагулянтов из связи с белками • тромболитических и антиагрегантных и антикоагулянтных препаратов

Старая редакция	Новая редакция
(тиклопидина) • дигоксина вследствие снижения его почечной экскреции • гипогликемических средств для приема внутрь (производные сульфонилмочевины) и инсулина за счет гипогликемических свойств самой АСК в высоких дозах и вытеснения производных сульфонил-мочевины из связи с белками плазмы крови • вальпроевой кислоты за счет вытеснения ее из связи с белками Одновременное применение АСК с ибупрофеном приводит к снижению кардиопротективных эффектов АСК. Аддитивный эффект наблюдается при одновременном приеме АСК с этанолом (алкоголем). АСК ослабляет действие урикозурических средств (бензбромарона) вследствие конкурентной тубулярной элиминации мочевой кислоты. Усиливая элиминацию салицилатов, системные глюкокортикостероиды (ГКС) ослабляют их действие. Антациды и колестирамин снижают всавывание препарата.	(тиклопидина) • дигоксина вследствие снижения его почечной экскреции • гипогликемических средств для приема внутрь (производные сульфонилмочевины) и инсулина за счет гипогликемических свойств самой АСК в высоких дозах и вытеснения производных сульфонил-мочевины из связи с белками плазмы крови • вальпроевой кислоты за счет вытеснения ее из связи с белками Одновременное применение АСК с ибупрофеном приводит к снижению кардиопротективных эффектов АСК. Аддитивный эффект наблюдается при одновременном приеме АСК с этанолом (алкоголем). АСК ослабляет действие урикозурических средств (бензбромарона) вследствие конкурентной тубулярной элиминации мочевой кислоты. Усиливая элиминацию салицилатов, системные глюкокортикостероиды (ГКС) ослабляют их действие. Антациды и колестирамин снижают всавывание препарата. **Метамизол может снижать эффект АСК в отношении агрегации тромбоцитов при одновременном приеме. Поэтому такую комбинацию следует использовать с осторожностью у пациентов, принимающих низкие дозы АСК для кардиопротекции.**

Менеджер по фармаконадзору, СНГ

Уполномоченное лицо по фармаконадзору в ЕАЭС Марчук В.А.