

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Регистрационное удостоверение № PN 000792/01

Дата регистрации «14» марта 2011 г.

ООО «Бакорен», Россия

460000, г. Оренбург, пр. Победы, 1

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Споробактерин


суспензия для приема внутрь

ООО «Бакорен», Россия

Изменение № 1

05 08 16

Дата внесения Изменения «___» _____ 20__ г.




Старая редакция	Новая редакция
Торговое наименование препарата: Споробактерин	Торговое наименование: Споробактерин
Раздел отсутствует	Международное непатентованное или группировочное наименование: Бациллюс субтилис
Раздел отсутствует	Фармакотерапевтическая группа: эубиотик
Раздел отсутствует	Код АТХ: A07FA
Назначение. Споробактерин применяют для лечения: - острых бактериальных кишечных инфекций, в том числе острой дизентерии, сальмонеллезов и др.; - дисбактериозов различной этиологии; - хирургической инфекции мягких тканей; - остеомиелита (при отсутствии крупных секвестров); - для профилактики и лечения осложнений, вызываемых патогенными и условно-патогенными микроорганизмами при хирургических и акушерско-гинекологических операциях.	Показания к применению: - острые бактериальные кишечные инфекции, в том числе острая дизентерия, сальмонеллез и др.; - дисбактериоз различной этиологии; - хирургические инфекции мягких тканей; - остеомиелит (при отсутствии крупных секвестров); - для профилактики и лечения осложнений, вызываемых патогенными и условно-патогенными микроорганизмами при хирургических и акушерско-гинекологических операциях.

Раздел отсутствует	Применение при беременности и в период грудного вскармливания: Действие препарата на беременных не изучалось. Препарат может применяться в период лактации.
Раздел отсутствует	Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами: Применение препарата на управление транспортными средствами и работу с механизмами влияния не оказывает.
	Возможные нежелательные реакции: При применении препарата по показаниям нежелательных реакций не выявлено.
Условия хранения и транспортирования. Препарат хранят и транспортируют в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре до 10 °С, в недоступном для детей месте. Допустима транспортировка при температуре до 25 °С не более 14 дней.	Хранение. При температуре не выше 25 °С. После вскрытия флакон может храниться при температуре (5 ±3) °С в течение 10 суток. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности. 2 года. Препарат с истекшим сроком годности применению не подлежит.	Срок годности. 3 года. Не применять по истечении срока годности.

	Производитель/Место производства/организация, принимающая претензии: ООО «Бакорен», Россия 460000, г. Оренбург, пр. Победы, 1 Тел. +7 (3532) 240-002,

Директор
ООО «Бакорен»



М.В. Никитенко