ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
РЕКТОБЕЛОЛ®

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Ректобелол®

Лекарственная форма: суппозитории ректальные

Состав
Активные вещества:

Трибромфенолят висмута и висмута оксида комплекс (ксероформ)	- 0,1 г
Красавки экстракт густой	- 0,02 г
Цинка сульфата гептагидрат	- 0,05 г
Вспомогательные вещества:	
Глицерол (глицерин дистиллированный)	- 0,12 г
Основа для суппозиториев (твердый жир, тип А)	- достаточное количество до получения суппозитория массой 2,25 г.

Описание
Суппозитории от желтовато-белого до зеленовато-желтого цвета торпедообразной формы, с запахом ксероформа, на разрезе допускается воздушный стержень. При хранении допускается появление едва заметного белого налета на поверхности суппозитория.

Фармакотерапевтическая группа: средство лечения геморроя.
Код АТХ: [C05AX03].

Фармакологические свойства
Обладает болеутоляющим, местным противовоспалительным, спазмолитическим, антисептическим, вяжущим и подсушивающим действием.

Показания к применению
Геморрой, трещины заднего прохода.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, атония кишечника, сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, тахиаритмия, миастения, закрытоугольная глаукома, аденома предстательной железы, беременность, лактация.

Способ применения
Ректально по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки. Максимальная суточная доза – 7 суппозиториев.

Побочное действие
Возможны аллергические реакции, жжение в области заднего прохода, сухость во рту, запор, послабление стула, сердцебиение, расширение зрачков, преходящие нарушения зрения (парез аккомодации), головная боль, головокружение, нарушение сна, сонливость.

48153

Передозировка
Симптомы: тошнота, рвота, психомоторное возбуждение, судороги, задержка мочеиспускания, снижение потоотделения, гипертермия.
Лечение: В этих случаях следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Особые указания
Препарат не следует применять в период деятельности, связанной с необходимостью концентрации внимания, быстрых психических и двигательных реакций (управление транспортными средствами, работа на станках и др.)

Форма выпуска
Суппозитории ректальные. По 5 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной. Две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения
В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта врача.

Предприятие изготовитель/организация, принимающая претензии
ОАО «Дальхимфарм», 680001, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, 22
Тел/факс (4212) 53-91-86.

Генеральный директор
ОАО «Дальхимфарм» В.И. Ничипоренко

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО О.А.О. «ДАЛЬХИМФАРМ» г. Хабаровск

МЗСР РФ
ГБУ «НЦЭСМП»
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 (0 0 0 0

48153