

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Бесалол**Регистрационный номер:****Торговое наименование:** Бесалол**Международное непатентованное или группировочное наименование:** белладонны листьев экстракт + фенилсалицилат**Лекарственная форма:** таблетки**Состав****1 таблетка содержит:***Действующие вещества:*

Фенилсалицилат 300 мг

Белладонны листьев экстракт (красавки экстракт густой) 10 мг

Вспомогательные вещества:

Целлюлоза микрокристаллическая (МКЦ-101) 155 мг

Повидон К-25 (коллидон 25) 5 мг

Карбоксиметилкрахмал натрия (примогель) 25 мг

Магния стеарат 5 мг

Описание: круглые таблетки от светло-желтого до светло-коричневого цвета с более светлыми и более темными вкраплениями, плоскоцилиндрической формы с фаской и риской.**Фармакотерапевтическая группа:** спазмолитическое средство.**Код АТХ:** A03ED.**Фармакологические свойства**

Комбинированный препарат, оказывает спазмолитическое, антисекреторное и анальгезирующее (за счет м-холиноблокирующей активности экстракта красавки), антисептическое и противовоспалительное (за счет фенилсалицилата, распадающегося в щелочной среде кишечника на фенол и салициловую кислоту) действия.

Показания к применению

Препарат Бесалол показан к применению у взрослых пациентов при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся спазмами гладкой мускулатуры органов брюшной полости с дисбактериозом кишечника.

Противопоказания

Гиперчувствительность к действующим веществам или к любому из вспомогательных веществ; закрытоугольная глаукома, гипертрофия предстательной железы с нарушением

оттока мочи, желудочно-кишечное кровотечение, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности противопоказано.

Применение препарата в период грудного вскармливания противопоказано. В случае необходимости применения препарата в период лактации грудное вскармливание следует прекратить.

Способ применения и дозы

Внутрь, по 1 таблетке 2-3 раза в день.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Повышение внутриглазного давления, сухость слизистой оболочки полости рта, запоры, мириаза, парез аккомодации, головокружение, задержка мочи, аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: психомоторное возбуждение, паралич аккомодации, острая задержка мочи. В случае передозировки применение препарата следует прекратить и обратиться к врачу.

Лечение

Симптоматическая и поддерживающая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не описано.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Таблетки.

По 6 или 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 1, 2, 3, 4, 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Пачки помещают в групповую упаковку.

100, 200, 300, 400, 600, 800 контурных ячейковых упаковок вместе с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в коробку картонную (Для стационаров).

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии потребителей

Российская Федерация.

Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» (АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»).

665452, Иркутская обл., г.о. город Усолье-Сибирское, тер. Промышленный массив, ул. Индустриальная, зд. 62.

Тел.: +7 (395) 435-89-08.

Электронная почта: usolpharm@usolpharm.ru

Производитель

Российская Федерация.

АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»,

665452, Иркутская обл., г.о. город Усолье-Сибирское, тер. Промышленный массив, ул. Индустриальная, зд. 62.